

Tilføjet Identifikation af skib (Side 1)
Added Identification of ship (page 1)

Identifikation af skib / Identification of ship

Skibsnavn / *Ship Name:*

Kaldesignal / *Call Signal:*

IMO nummer / *IMO Number:*

Hjemmehavn / *Port of Reg.:*

3.6 ændret til: 3.8 Diclofenac suppositorier 50 mg 50 stk.

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics		(continued)	
Nyresten Galdesten Ledsmarter	3.8	Lægemiddelstof:	Diclofenac
		Form:	Suppositorier 50 mg
		Virkning:	Smertestillende.
		Dosering:	50 -100 mg mg x 1 dagligt
		Bivirkninger:	Nedsat appetit, sure opstød og halsbrand, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, luft i maven. Hovedpine, svimmelhed. Hududslæt og hudkløe.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato, (Voltaren, 2care4)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur - ikke over 30 grader
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical. Bør ikke anvendes ved: 1. allergi for acetylsalicylsyre, 2. astmapatienter, 3. patienter i blodfortyndende behandling, 4. patienter med symptomer på mavesår.

15

3.6 changed to: 3.8 Diclofenac suppositorie 50 mg 50 pcs.

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics		(continued)	
Kidney stone Gall stone Pain in joint	3.8	Active pharmaceutical ingredients:	Diclofenac
		Form:	Suppositorie 50 mg
		Effect:	Analgesic
		Dosage:	50 - 100 mg ones daily
		Side-effects:	Loss of appetite, heartburn and acid regurgitation, nausea and vomiting, abdominal pain, diarrhea, flatulence, headache, dizziness, skin rash, itchy skin.
		Validity:	3 years from the date of production (Voltaren,2care4)
		Storage:	Normal temperature - not above 30 degrees
		Remarks:	Consult Radio Medical. Not to be used in case of: 1. allergy to acetylsalicylic acid, 2. asthma patients, 3. patients in blood diluting treatment, 4. patients with symptoms of ulcer.

16

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics

(continued)

Inflammation of the skin. Arthritis Pain.	3.7	Active pharmaceutical ingredients:	Diclofenac
		Form:	Ointment with 11,6 mg/g
		Effect:	Analgesic
		Dosage:	Apply a thin layer to the skin 3-4 times daily
		Side-effects:	Redness, rash, itching, eczema, skin rashes when in contact with the product
		Validity:	3 years from the date of production (Voltaren®gel, Novatis Healthcare A/S)
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Only to be used on intact skin. May not be used in the face.

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness

Allergisk shock	4.1	Lægemiddelstof:	Adrenalin.
		Form:	Injektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Øger pulsen, hjertets pumpekraft og blodtrykket. Sammenækning af blodkar. Virker 2 - 5 minutter efter intramuskulær injektion. Omsættes meget hurtigt. Halveringstiden i blodet er 2 - 3 minutter.
		Dosering:	Omgående (voksne): 0,6 mg (godt en halv ampul) dybt intramuskulært. Kan eventuelt gentages, hvis virkningen udebliver.
		Bivirkninger:	Blodtryksstigning, hurtig puls, rysten og svimmelhed.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Adrenalin®, DAK), hvis opbevaret ved 2-8°C. 6 måneder fra udlevering (Adrenalin®, DAK), hvis opbevaret under 25°C
		Opbevaring:	Opbevares køligt og mørkt.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Er livsfarligt at anvende ved shock forårsaget af blod- eller væsketab.
Allergic shock	4.1	Active pharmaceutical ingredients:	Epinephrine.
		Form:	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Increases the pulse, the pumping power of the heart, and the blood pressure. Contraction of blood vessels. Takes effect 2-5 minutes after intramuscular injection. Transformed very quickly. The half-life in the blood is 2-3 minutes.
		Dosage:	Immediately (adults): 0.6 mg (about half an ampoule) given deep intramuscular. May be repeated if the effect is insufficient.
		Side-effects:	High blood pressure, rapid pulse, shivering, and dizziness.
		Validity:	2 years from the date of production (Adrenalin®, DAK), if stored at 2 °C - 8 °C or 6 months after extradition, if stored less than 25 °C.
		Storage:	To be stored in a cool and dark place.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Potentially fatal if used to treat shock caused by loss of blood or fluid.

6.3 Klysma Diazepam styrke ændret til 5 mg/ml

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion			
Universelle kramper Kramper fra forgiftninger Abstinenskramper Epilepsi Akut sindsyge	6.3	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ .
		Form:	Klysma, 5 mg/ml, til anvendelse i endetarmen
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	Efter aftale med Radio Medical - 1 klysma tømmes ind i endetarmen.
		Bivirkninger:	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	2,5 år fra produktionsdato (Stesolid®, Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..
		Opbevaring:	Almindelig temperatur..
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>

22

6.3 Enema Diazepam strength changed to 5 mg/ml

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)			
Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy Acute mental illness	6.3	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam. Δ
		Form:	Enema, 5 mg /ml, for insertion into the rectum.
		Effect:	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	After consult of Radio Medical - 1 enema is emptied into the rectum.
		Side-effects:	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the aluminiumbag.
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

23

6.3 Diazepam klysma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion			
Universelle kramper Kramper fra forgiftninger Abstinenskramper Epilepsi Akut sindsyge	6.3	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ .
		Form:	Klysma, 4 mg/ml, til anvendelse i endetarmen
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	Efter aftale med Radio Medical - 1 klysma tømmes ind i endetarmen.
		Bivirkninger:	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	2,5 år fra produktionsdato (Stesolid [®] , Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..
		Opbevaring:	Almindelig temperatur..
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>

22

6.3 Diazepam enema strength corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)			
Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy Acute mental illness	6.3	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam Δ .
		Form:	Enema, 4 mg /ml, for insertion into the rectum.
		Effect:	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	After consult of Radio Medical - 1 enema is emptied into the rectum.
		Side-effects:	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	2,5 years from the date of production (Stesolid [®] , Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the aluminiumbag.
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

23

7.1 Tablet Phenoxymethylpenicillin ændret til 660 - 800 mg.

7.1 tablet Phenoxymethylpenicillin changed to 660 - 800 mg.

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections			
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemøre- betændelse Lungebetændelse	7.1	Lægemiddelstof:	Phenoxymethylpenicillin
		Form:	Tabletter à 660 - 800 mg (ca. 1 mill. IE)
		Virkning:	Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene
		Dosering:	400-800 mg × 2 – 4 dagligt
		Bivirkninger:	Kvalme, diarré og hududslæt. Sjældent ses overfølsomhedsshock
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Primcillin®, MEDA)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift. Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1)
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia	7.1	Active pharmaceutical ingredients:	Phenoxymethylpenicillin.
		Form:	Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU)
		Effect:	Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.
		Dosage:	400-800 mg × 2-4 times daily
		Side-effects:	Vomiting, diarrhoea and rash. Rarely allergic shock
		Validity:	3 years from the date of production (Primcillin®, MEDA)
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)

7.10 ændret til tetanustoksid holdig vaccine 1. stk.

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
<p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampevaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>	7.10	Lægemiddelstof:	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).
		Form:	Injektionsvæske
		Virkning:	Aktiverer patientens immunsystem.
		Dosering:	Følg ordination fra Radio Medical
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).

29

7.10 Change to: Vaccine containing Tetanustoxid 1 pc.

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
<p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation</p>	7.10	Active pharmaceutical ingredients:	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).
		Form:	Injection liquid
		Effect:	Activates the patient's immune system.
		Dosage:	Follow prescription from Radio Medical
		Side-effects:	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		Validity:	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

30

7.10 Tetanus holdig vaccine - styrke fjernet, da det kommer an på hvad der udleveres - følg råd fra Radio Medical

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
<p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampevaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>	7.10	Lægemiddelstof:	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).
		Form:	Injektionsvæske
		Virkning:	Aktiverer patientens immunsystem.
		Dosering:	Følg ordination fra Radio Medical
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.
<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).		

29

7.10 Tetanus-containing vaccine - strength removed as it depends on what is delivered - follow advice from Radio Medical.

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
<p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p>	7.10	Active pharmaceutical ingredients:	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).
		Form:	Injection liquid
		Effect:	Activates the patient's immune system.
		Dosage:	Follow prescription from Radio Medical
		Side-effects:	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		Validity:	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .		

30

7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
<p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampevaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>	7.10	Lægemiddelstof:	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).
		Form:	Injektionsvæske
		Virkning:	Aktiverer patientens immunsystem.
		Dosering:	Følg ordination fra Radio Medical
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).

29

7.10 Vaccine Tetanus - label corrected

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
<p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p>	7.10	Active pharmaceutical ingredients:	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).
		Form:	Injection liquid
		Effect:	Activates the patient's immune system.
		Dosage:	Follow prescription from Radio Medical
		Side-effects:	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		Validity:	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

30

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

Forebyggelse af malaria	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Forebyggelse fra 1 dag før ankomst til 7 dage efter afrejse fra malariaområdet. Dosis voksne: 1 tablet dagligt.
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslet. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Forebyggelse: Se Søfartsstyrelsens gældende vejledning om Malaria.
Prevention of malaria	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquone/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Prevents malaria.
		Dosage:	The tablets <i>must</i> be taken with fatty food (milk/butter). The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 7 days after departure from the malaria area. Dose, adults: 1 tablet a day.
		Side-effects:	Headache, stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, coughing and allergic rash. If the patient vomits within 1 hour after have taken the medicament, a new tablet has to be consumed.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Primary prevention of malaria: See the Danish Maritime Authority's guide on Malaria.
Forebyggelse af malaria Anvendes til forebyggelse, dersom man ikke tåler 8.1 Anvendes sommetider i kombination med 8.3 til behandling.	8.2	Lægemiddelstof:	Doxycylin.
		Form:	Tablet à 200mg
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Dosis voksne og børn over 12 år: ½ tablet dagligt. Indtages med et glas vand eller et let måltid uden mælkeprodukter. Behandlingen udstrækkes fra 1 dag før ankomst til 4 uger efter afrejse fra malariaområdet.
		Bivirkninger:	Kvalme, vaginal svamp og toksiske hudreaktioner i forbindelse med sollys.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Vibradox®, .
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Må ikke anvendes af gravide eller ammende eller af børn under 12 år. Direkte sollys bør undgås. Interaktion med mange lægemidler.

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

Forebyggelse af malaria	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Forebyggelse fra 1 dag før ankomst til 7 dage efter afrejse fra malariaområdet. Dosis voksne: 1 tablet dagligt.
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslet. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Forebyggelse: Se Søfartsstyrelsens gældende vejledning om Malaria.
Prevention of malaria	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquone/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Prevents malaria.
		Dosage:	The tablets <i>must</i> be taken with fatty food (milk/butter). The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 7 days after departure from the malaria area. Dose, adults: 1 tablet a day.
		Side-effects:	Headache, stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, coughing and allergic rash. If the patient vomits within 1 hour after have taken the medicament, a new tablet has to be consumed.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Primary prevention of malaria: See the Danish Maritime Authority's guide on Malaria.
Forebyggelse af malaria Anvendes til forebyggelse, dersom man ikke tåler 8.1 Anvendes sommetider i kombination med 8.3 til behandling.	8.2	Lægemiddelstof:	Doxycylin.
		Form:	Tablet à 200mg
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Dosis voksne og børn over 12 år: ½ tablet dagligt. Indtages med et glas vand eller et let måltid uden mælkeprodukter. Behandlingen udstrækkes fra 1 dag før ankomst til 4 uger efter afrejse fra malariaområdet.
		Bivirkninger:	Kvalme, vaginal svamp og toksiske hudreaktioner i forbindelse med sollys.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Vibradox®, .
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Må ikke anvendes af gravide eller ammende eller af børn under 12 år. Direkte sollys bør undgås. Interaktion med mange lægemidler.

8.1 (Behandling) Brugervejledning rettet
8.1 (Treatment) User instruction corrected

Grp. 8. Malaria – <u>behandling</u> / Malaria – <u>Treatment</u>			
<p>Førstevalgspræparat til behandling af ukompliceret malaria på betingelse af, at Malarone® ikke blev indtaget som forebyggende middel.</p> <p>Positiv malaria test eller almen sygdomsfornemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria</p>	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Hæmmer celledelingen af malariaparasiteri leveren.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Dosis voksne: 4 tabletter x 1 dagligt i 3 dage
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslæt. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical uanset resultatet af malariatesten. Patientens almen tilstand skal bedres og temperaturen blive normal efter 2 – 3 dages behandling. I modsat fald kan man i samråd med Radio Medical fortsætte med 8.3.
<p>First choice of medicament for treatment of uncomplicated malaria on the condition that Malarone® has not been taken as a preventive medicament.</p> <p>Positive Malaria test or general feeling of being ill and fever combined with a relevant risk of malaria</p>	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquon/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Inhibits the proliferation of the malaria parasite in the liver
		Dosage:	The tablets must be taken with fatty food (milk / butter). Dose adult 4 tablets daily for 3 days.
		Side-effects:	Headache, slight stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, and coughing. If the patient vomits within 1 hour after having taken the medicament, the treatment is repeated.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical. The patient should be recovering after 2-3 days treatment. If this is not the case, proceed with 8.2 after having consulted Radio Medical.

Rettet i 8.1 Brugervejledning for behandlingen af Malaria
Corrected 8.1 User instruction for treatment of Malaria

Grp. 8. Malaria – <u>behandling</u> / Malaria – <u>Treatment</u>			
Førstevalgspræparat til behandling af ukompliceret malaria på betingelse af, at Atovaquon/Proguanil ikke blev indtaget som forebyggende middel. Positiv malaria test eller almen sygdomsfornemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Hæmmer celledelingen af malariaparasiteri leveren.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Dosis voksne: 4 tabletter x 1 dagligt i 3 dage
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslet. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical uanset resultatet af malariatesten. Patientens almen tilstand skal bedres og temperaturen blive normal efter 2 – 3 dages behandling. I modsat fald kan man i samråd med Radio Medical fortsætte med 8.3.
First choice of medicament for treatment of uncomplicated malaria on the condition that Atovaquon/Proguanil has not been taken as a preventive medicament. Positive Malaria test or general feeling of being ill and fever combined with a relevant risk of malaria	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquon/Proguanil
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Inhibits the proliferation of the malaria parasite in the liver
		Dosage:	The tablets must be taken with fatty food (milk / butter). Dose, adult 4 tablets daily for 3 days.
		Side-effects:	Headache, slight stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, and coughing. If the patient vomits within 1 hour after having taken the medicament, the treatment is repeated.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical. The patient should be recovering after 2-3 days treatment. If this is not the case, proceed with 8.3 after having consulted Radio Medical.

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

Forebyggelse af malaria	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Forebyggelse fra 1 dag før ankomst til 7 dage efter afrejse fra malariaområdet. Dosis voksne: 1 tablet dagligt.
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslet. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Forebyggelse: Se Søfartsstyrelsens gældende vejledning om Malaria.
Prevention of malaria	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquone/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Prevents malaria.
		Dosage:	The tablets <i>must</i> be taken with fatty food (milk/butter). The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 7 days after departure from the malaria area. Dose, adults: 1 tablet a day.
		Side-effects:	Headache, stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, coughing and allergic rash. If the patient vomits within 1 hour after have taken the medicament, a new tablet has to be consumed.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Primary prevention of malaria: See the Danish Maritime Authority's guide on Malaria.
Forebyggelse af malaria Anvendes til forebyggelse, dersom man ikke tåler 8.1 Anvendes sommetider i kombination med 8.3 til behandling.	8.2	Lægemiddelstof:	Doxycylin.
		Form:	Tablet à 200mg
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Dosis voksne og børn over 12 år: ½ tablet dagligt. Indtages med et glas vand eller et let måltid uden mælkeprodukter. Behandlingen udstrækkes fra 1 dag før ankomst til 4 uger efter afrejse fra malariaområdet.
		Bivirkninger:	Kvalme, vaginal svamp og toksiske hudreaktioner i forbindelse med sollys.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Vibradox®, .
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Må ikke anvendes af gravide eller ammende eller af børn under 12 år. Direkte sollys bør undgås. Interaktion med mange lægemidler.

8.2 Doxycyclin styrke ændret til 100 mg
8.2 Doxycyclin strength changed to 100 mg

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention			
<p>Forebyggelse af malaria</p> <p>Anvendes til forebyggelse, dersom man ikke tåler 8.1</p> <p>Anvendes sommetider i kombination med 8.3 til behandling.</p>	8.2	Lægemiddelstof:	Doxycyklin.
		Form:	Tablets 100 mg
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Dosis voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Indtages med et glas vand eller et let måltid uden mælkeprodukter. Behandlingen udstrækkes fra 1 dag før ankomst til 4 uger efter afrejse fra malariaområdet.
		Bivirkninger:	Kvalme, vaginal svamp og toksiske hudreaktioner i forbindelse med sollys.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Vibradox®, Sandoz)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical. Må ikke anvendes af gravide eller ammende eller af børn under 12 år. Direkte sollys bør undgås. Interaktion med mange lægemidler.

32

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention (continued)			
<p>Prevention of malaria</p> <p>To be used for prevention if 8.1 is not tolerated</p> <p>Some times used in combination with 8.3 for treatment</p>	8.2	Active pharmaceutical ingredients:	Doxycycline.
		Form:	Tablets of 100 mg.
		Effect:	Prevents malaria.
		Dosage:	To be taken with a glass of water or a light meal without any milk products. The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 4 weeks after departure from the malaria area. Dose, adult and children over the age of 12 or 45 kg: 1 tablet daily
		Side-effects:	Nausea, vaginal candidiasis, toxic skin reaction in connection with sunlight.
		Validity:	5 years from the date of production (vibradox®, Sandoz)
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> Not to be used by pregnant or breast-feeding woman or children below the age of 12. Direct sunlight should be avoided. Interaction with many other medicines.

33

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

(continued)

Blødgøring og løsning af ørevoks.	13.9	Lægemiddelstof:	Allantoin
		Form:	Væske
		Virkning:	Blødgør og løsner ørevoks
		Dosering:	10-20 dråber dryppes i øret. Et stykke vat anbringes i øret og personen lejres således at dråberne forbliver i øret. Efter 20 -50 min. skylles øret med lunkent vand (37°C).
		Bivirkninger:	Se indlæggesseddell
		Holdbarhed:	Se produktet.(Removax®)
		Opbevaring:	Opbevares ved almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må ikke anvendes hvis der er hul i trommehinden. Må ikke anvendes ved betændelse eller smerter i øret og ved allergi overfor indholdsstofferne.
Softens and loosens cerumen	13.9	Active Pharmaceutical ingredients:	Allantoin
		Form:	Fluid
		Effect:	Softens and dissolving earwax
		Dosage:	10-20 drops in the ear. A piece of cotton wool is placed in the ear and the person is placed, so that the droplets remain in the ear. After 20-50 min rinse the ear with warm water (37° C).
		Side-effects:	See package leaflet.
		Validity:	See expire date on the product (Remowax ®)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Do not use if there is a hole in the eardrum. Not for use by inflammation or pain in the ear and allergy to the ingredients.
Inflammatoriske øjensygdomme	13.11	Lægemiddelstof:	Tropicamid
		Form:	Øjendråber 1%
		Virkning:	Udvider pupillen
		Dosering:	Akut: 1-2 dråber 3 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Feber, forstoppelse, hjertebanken, hallucinationer, excitation, konfusion, ansigtsrødme, akkomodationsbesvær, øjenirritation, fotofobi.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato,(Mydriacyl® , S.A. Alcon-couvreur N.V)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Inflammatory eye diseases	13.11	Active Pharmaceutical ingredients:	Tropicamid
		Form:	Eye drops 1%
		Effect:	Enlarges the pupil
		Dosage:	Acut: 1-2 drops 3 times a day.
		Side-effects:	Fever, constipation, palpitations, hallucinations, excitation, comfusion, flushing, difficulties with accommodation, eye irritation, photophobia
		Validity:	3 years from the date of production,(Mydriacyl® , S.A. Alcon-couvreur N.V)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical.

Tilføjet 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortison- øredråber
 Added 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortisone - eardrops

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears			
Øregangs eksem	13.12	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin / Hydrocortison
		Form:	Øredråber
		Virkning:	Behandling af øregangs eksem
		Dosering:	3 dråber i berørte øre 2 gange daglig
		Bivirkninger:	Ørekløe, øresmerter, svimmelhed
		Holdbarhed:	Ubrudt 2 år fra produktionsdato (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Opbevaring:	Beskytte mod lys og ikke over 25 c. Må ikke opbevares i køleskab.
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical Danmark
Ear eczema	13.12	Active Pharmaceutical ingredients:	Ciprofloxacin / Hydrocortisone
		Form:	Eardrops
		Effect:	Treatment of ear canal eczema
		Dosage:	3 drops in affected ear twice daily
		Side-effects:	Ear itching, earache, dizziness
		Validity:	Unbroken 2 years from production date (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Storage:	Protect from light and not more than 25 c. Do not refrigerate.
		Remarks:	Consult Radio Medical Danmark

16.3 Hydroxyethylstivelse udgår

16.3 Hydroxyethyl amoid is discontinued product

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (continued)			
Food substitute Loss of liquids (See also 12.7)	16.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Glucose and sodium chloride.
		Form:	Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		Effect:	Replaces liquids, glucose and salts.
		Dosage:	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	3 years from the date of production (Natriumklorid-Glucose" Braun", B. Braun Medical A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4/9.5).
Væske til gennemskylning af intravenøs kanyle. Sårbehandling. Øjenbehandling	16.5	Lægemiddelstof:	Natriumklorid
		Form:	Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder
		Virkning:	Fjerner blod fra venekanyler, rensesår og øjne
		Dosering:	Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra Radio Medical
		Bivirkninger:	Ingen relevante
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Fluid for flushing intravenous needle. Treatment of wounds. Treatment of eyes	16.5	Active pharmaceutical ingredients:	Sodium chloride
		Form:	Fluid 0,9 % in containers of 20 ml
		Effect:	Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes
		Dosage:	See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from Radio Medical.
		Side-effects:	No relevant ones
		Validity:	3 years from the date of production (Fresenius Kabi)
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3
 Added 16.6 Gelatine sodium Chlorid replace 16.3

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar		(continued)	
2. valgs præparat ved: Blodtab Shock eller risiko for shock, når årsagen er et akut blodtab MFAG, appendix 13	16.6	Lægemiddelstof:	Gelatine, Natriumchlorid
		Form:	Infusionsvæske 40 g succinyleret gelatine og 7 g natriumchlorid / liter. Beholdere à 500 ml til intravenøs anvendelse.
		Virkning:	Udvider plasmavolumenet svarende til den indgivne mængde.
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical. På grund af risikoen for overfølsomhedsshock indgives de første 10 - 20 ml under stor forsigtighed og nøje observation. Ved overfyldning af kredsløbet indgives Furosemid (9.5).
		Bivirkninger:	Allergiske reaktioner. Overfølsomhedsshock.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (.Gelofusine, Plast flaske , B. Braun Melsungen AG)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical.
Second choice of medicament in case of: Loss of blood Shock or risk of shock caused by an acute loss of blood MFAG, appendix 13	16.6	Active Pharmaceutical ingredients:	Gelatine, Sodium chloride
		Form:	Infusion liquid.40 g succinyleret gelatine og 7 g Sodium Chloride / litre Containers of 500 ml for intravenous use.
		Effect:	Enlarges the plasma volume equivalent to the amount infused.
		Dosage:	After ordination from Radio Medical. Because of the risk of allergic shock, the first 10-20 ml are infused very carefully and under close observation. If overloading including oedema of the lungs occurs: Give Furosemide (9.5).
		Side-effects:	Allergic reactions. Allergic shock.
		Validity:	3 years from the date of production (Gelofusine, Plastic bottle B. Braun Melsungen AG).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult Radio Medical.

Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning
 Added B.14 Torniquet to artieriel bleeding

B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape		
B.1	Sterile gazekompresser, ca.5 x 5 cm, ca.8 lag	20 stk.
B.1	Sterile gaze compress, approx.5 x 5 cm, approx. 8 layers	20 pcs.
B.2	Sterile gazekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	20 stk.
B.2	Sterile gaze compress, approx.10 x10 cm, approx. 8 layers	20 pcs.
B.3	Steril absorberende ikke-klæbende forbindelse, ca. 20 x 30 cm	5 stk.
B.3	Sterile absorbent non-adhesive surgical dressing bandage, approx. 20 x 30 cm	5 pcs.
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	10 stk.
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	10 pcs.
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, "Jelonet"	2 x 10 stk.
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, "Jelonet"	2 x 10 pcs.
B.6	Steril absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	5 stk.
B.6	Sterile non-adhesive surgical dressing bandages, approx. 10 x 10 cm	5 pcs.
B.7	Gazeviskers, usterile	100 stk.
B.7	Gauze swaps, non-sterile	100 pcs.
B.8	Tube gaze til fingerforbindinger	10 stk.
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	10 pcs.
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cmx4m	10 ruller
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cmx4m	10 rolls
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	1 pakke
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	1 pack
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	5 pakker
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	5 packs
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	1 rulle
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	1 roll
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	2 ruller
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	2 rolls
B.14	Årepresse til pulsåreblødning	1 stk.
B.14	Torniquet to artieriel bleeding	1 pc.

Tilføjet C.13 Engangsforklæde
 Added C.13 Disposable apron

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation		
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	100 stk.
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	100 pcs.
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	100 stk.
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	100 pcs.
C.5	Vaskesvampe, éngangs	25 stk.
C.5	Bath sponge, disposable	25 pcs.
C.6	Beskyttelsesbriller	1 stk.
C.6	Protective goggles	1 pc.
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	5 stk.
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	5 pcs.
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	250 ml
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	250 ml
C.9	Mundbind 3 lags, bredde 18 cm	50 stk.
C.9	Mask, 3 layer, width 18 cm	50 pcs.
C.10	Ligpose voksen	1 stk.
C.10	Body bag adult	1 pc.
C.11	Engangshandsker af latex, usterile, medium	100 stk.
C.11	Disposable gloves, latex, non-sterile, medium	100 pcs.
C.12	Engangshandsker af latex, usterile, small	100 stk.
C.12	Disposable gloves, latex, non-sterile, small	100 pcs.
C.13	Engangsforklæde	10 stk.
C.13	Disposable apron	10 pcs.
C.14	Lagen, sterilt	1 stk.
C.14	Bed sheet, sterile	1 pc.

Tilføjet F.7 Hypotermi termometer
 Added F.7 Hypotermi thermometer

F. Udstyr til medicinsk undersøgelse / Equipment for medical examination		
F.1	Blodtryksmåler	1 stk.
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pc.
F.2	Stetoskop	1 stk.
F.2	Stethoscope	1 pc.
F.3	Digitalt lægetermometer	2 stk.
F.3	Digital clinical thermometer	2 pcs.
F.4	Pencillygte m. batterier	2 stk.
F.4	Pencil lamp w/batteries	2 pcs.
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	10 stk.
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	10 pcs.
F.7	Hypotermi Termometer	1 stk.
F.7	Hypotermi thermometer	1 pc.

72

Tilføjet I.3 Engangskatetre CH 14 til kvinder
 Added I.3 Catheters for single use, CH 14 for women

I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder		
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	5 stk.
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	5 pcs.
I.2	Urinkolbe, plastic	1 stk.
I.2	Bed bottle, plastic	1 pc.
I.3	Engangskatetre CH 14 til kvinder	5 stk.
I.3	Catheters for single use, CH 14 for women	5 pcs.

73

Ændret N.1 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- pulver form
 Tilføjet N.3 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- væskeform
 Changed N.1 Insecticide, not specified - powder form
 Added N.3 Insecticide, not specified - liquid form

N. Insektbekæmpelsesmidler og kloreringsmidler til rensning af drikkevand/ Insecticides and chlorinating agents for purifying drinking water (se note / see note)		
N.1	Insektbekæmpelsesmiddel - pulver form (se note)	1 dåse
N.1	Insecticide, not specified - powder form (see note)	1 tin
N.2	Kloreringsmiddel til drikkevand, 100 g	2 stk.
N.2	Chlorinating agent for drinking water, 100 g	2 pcs.
N.3	Insektbekæmpelsesmiddel- væskeform (se note)	1 dåse
N.3	Insecticide - liquid form (see note)	1 Tin
N.1 + N.2 + N.3 Klor og insektbekæmpelsesmidler må ikke opbevares sammen med lægemidler og medicinsk udstyr. N.1 + N.2 + N.3 Chlor and insecticides must not be stored within the ship medicine chest		

75

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears					
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	0,50 %	5 x 1g
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocaine	Ointment	0,50 %	5 x 1g
13.3 (π)	S01BA01	Dexamethasone	Dråber	1 mg / ml	5 ml
13.3 (π)	S01BA01	Dexamethasone	Drops	1 mg / ml	5 ml
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	2 %	10 ml
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	2 %	10 ml
13.6 (π)	S01AD03	Aciclovir	Salve	3 %	4,5 g
13.6 (π)	S01AD03	Aciclovir	Ointment	3 %	4,5 g
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	1 %	5 x 5g
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Drops / gel	1 %	5 x 5g
13.9	-	Medium til at blødgøre ørevoks, inkl. øresprøjte	-	-	10 ml
13.9	-	Medium to soften earwax, incl. earsyringe	-	-	10 ml
13.11 (π)	S01FA06	Tropicamid	Dråber	1 %	15 ml
13.11 (π)	S01FA06	Tropicamide	Drops	1 %	15 ml
Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology					
14.1 (π)	J02AC01	Fluconazol	Kapsel	150 mg	2 stk.
14.1 (π)	J02AC01	Fluconazole	Capsula	150 mg	2 pcs.
14.2	G02AB01	Methylegometrin	Tablet	0,125 mg	10 pcs.
14.2	G02AB01	Methylegometrine	Tablet	0,125 mg	10 pcs.
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord. 14.2 shall only be available IF women on board.					
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold					
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	30 mg	40 stk.
15.1	R05DA09	Dextromethorphone	Tablet	30 mg	40 pcs.
15.2 (π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doser
15.2 (π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doses
15.3 (π)	R03CC03	Terbutalin	Inj. Væske	0,5 mg/ml	5 x 1 ml
15.3 (π)	R03CC03	Terbutaline	Inj. Liquid	0,5 mg/ml	5 x 1 ml
15.4 (π)	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doser
15.4 (π)	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doses
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / Spray	1 mg / ml	3 x 10 ml
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / Spray	1 mg / ml	3 x 10 ml
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)					
16.1 (π)	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	10 x 1 liter
16.1 (π)	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	10 x 1 litre
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	25/4,5 mg/ml	10 x 1 liter
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Sodium chlorid	Inf. Liquid	25/4,5 mg/ml	10 x 1 litre
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylstivelse	Inf. Væske	60 mg/ml	5 x 500 ml
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylamyloid	Inf. Liquid	60 mg/ml	5 x 500 ml
16.5 (π)	V07AB	Natriumklorid	Væske	0.9 %	20 x 20 ml
16.5 (π)	V07AB	Sodium chloride	Liquid	0.9 %	20 x 20 ml
Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder Infusion liquids may not be in glass container					

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml er erstattet med 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml is changed to 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears					
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	0,50 %	5 x 1g
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocaine	Oinment	0,50 %	5 x 1g
13.3 (π)	S01BA01	Dexamethasone	Dråber	1 mg / ml	5 ml
13.3 (π)	S01BA01	Dexamethasone	Drops	1 mg / ml	5 ml
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	2 %	10 ml
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	2 %	10 ml
13.6 (π)	S01AD03	Aciclovir	Salve	3 %	4,5 g
13.6 (π)	S01AD03	Aciclovir	Oinment	3 %	4,5 g
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	1 %	5 x 5g
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Drops / gel	1 %	5 x 5g
13.9	-	Medium til at blødgøre ørevoks, inkl. øresprøjte	-	-	10 ml
13.9	-	Medium to soften earwax, incl. earsyringe	-	-	10 ml
13.11 (π)	S01FA06	Tropicamid	Dråber	1 %	15 ml
13.11 (π)	S01FA06	Tropicamide	Drops	1 %	15 ml
Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology					
14.1 (π)	J02AC01	Fluconazol	Kapsel	150 mg	2 stk.
14.1 (π)	J02AC01	Fluconazole	Capsula	150 mg	2 pcs.
14.2	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	0,125 mg	10 pcs.
14.2	G02AB01	Methylergometrine	Tablet	0,125 mg	10 pcs.
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord. 14.2 shall only be available IF women on board.					
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold					
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	30 mg	40 stk.
15.1	R05DA09	Dextromethorphone	Tablet	30 mg	40 pcs.
15.2 (π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doser
15.2 (π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doses
15.4 (π)	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doser
15.4 (π)	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doses
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / Spray	1 mg / ml	3 x 10 ml
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / Spray	1 mg / ml	3 x 10 ml
15.6(π)	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Væske	0,5 mg/ml	5 x 1 ml
15.6(π)	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Liquid	0,5 mg/ml	5 x 1 ml
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)					
16.1 (π)	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	10 x 1 liter
16.1 (π)	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	10 x 1 litre
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	25/4,5 mg/ml	10 x 1 liter
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Sodium chlorid	Inf. Liquid	25/4,5 mg/ml	10 x 1 litre
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylstivelse	Inf. Væske	60 mg/ml	5 x 500 ml
16.3 (π)	B05AA07	Hydroxyethylamyloid	Inf. Liquid	60 mg/ml	5 x 500 ml
16.5 (π)	V07AB	Natriumklorid	Væske	0.9 %	20 x 20 ml
16.5 (π)	V07AB	Sodium chloride	Liquid	0.9 %	20 x 20 ml
Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder Infusion liquids may not be in glass container					

D.4 Sutur fjernet firma navn.

D.4 Sutur removed company name

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
D. Sårbehandling / Treatment of wounds		
D.1	Suturtape, "Steri-Strip™"	25 stk.
D.1	Suturetape, "Steri-Strip™"	25 pcs.
D.2	Klæbesutur, Dermabond	6 amuller
D.2	Adhesive suture, Dermabond	6 ampoules
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS eller DS 25	12 stk.
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS or DS 25	12 pcs.
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	1 stk.
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18x9x3 cm	1 pc.
D.6	Engangsskalpel, steril, nr. 23	5 stk.
D.6	Disposable scalpel, sterile, no. 23	5 pcs.
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	1 stk.
D.7	Surgical scissors w/straight points	1 pc.
D.8	Kirurgisk saks med krum spids	1 stk.
D.8	Surgical scissors w/curved points	1 pc.
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	1 stk.
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	1 pc.
D.10	Anatomisk pincet	1 stk.
D.10	Anatomical forceps (tweezers)	1 pc.
D.11	Splintpincet	1 stk.
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	1 pc.
D.12	Pean, krum	2 stk.
D.12	Pean, curved	2 pcs.
D.13	Nåleholder	2 stk.
D.13	Suture - holder	2 pcs.
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	3 stk.
D.14	Safety razor, disposable single use	3 pcs.
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	8 stk.
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	8 pcs.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
L. Tandlægeudstyr / Equipment for dental examination and treatment (Se note / see note)		
L.1	Coltosol®, færdigblandet tandcement i tuber à 8g (se note)	5 stk.
L.1	Coltosol®, dental filling material ready for use, tubes of 8 g (see note)	5 pcs.
L.2	Skyllekanyle	1 stk.
L.2	Dental rinse needle	1 pc.
L.3	Specialinstrument til tandcement	1 stk.
L.3	Special instrument for dental filling material	1 pc.
L.4	Mundspejl	1 stk.
L.4	Mouth mirror	1 pc.
L.5	Ekskavator	1 stk.
L.5	Excavator	1 pc.
L.6	Fyldningsfjerner	1 stk.
L.6	Filling remover	1 pc.
L.7	Rustfri stålæske med låg til tandudlægeudstyr	1 stk.
L.7	Instrument box, stainless steel with lid for dental equipment	1 pc.
<p>L: Tandlægeudstyr skal ikke forefindes på skibe med fart mindre end 175 sømil fra EU/EØS landes kyster. L: Dental equipment shall not be on ships in voyage less than 175 nautical miles from EU/EEA countries' coast L.1: Tandcement skal være inklusive instrument til uddrivning af cement fra tuben. L.1: Filling material shall include instrument for expulsion of the material from the tube.</p>		
M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing		
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	20 stk.
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	20 pcs.
M.2	Varmedunk	1 stk.
M.2	Hot-water bottle	1 pc.
M.3	Bækken	1 stk.
M.3	Bedpan	1 pc.
N. Insektbekæmpelsesmidler og kloreringsmidler til rensning af drikkevand/ Insecticides and chlorinating agents for purifying drinking water (se note / see note)		
N.1	Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret	1 dåse
N.1	Insecticide, not specified	1 tin
N.2	Kloreringsmiddel til drikkevand, 100 g	2 stk.
N.2	Chlorinating agent for drinking water, 100 g	2 pcs.
<p>N.1 + N.2 Klor og insektbekæmpelsesmidler må ikke opbevares sammen med lægemidler og medicinsk udstyr. N.1 + N.2 Chlor and insecticides must not be stored within the ship medicine chest</p>		
O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.		
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog	1 stk.
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority	1 pc.
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning (se note)	1 stk kat. A
O.3	Inventory, Control Document and User Instruction (see note)	1 pc. Cat. A
O.5	Radio Medical Optegnelser	1 stk.
O.5	Radio Medical Records	1 pc.
<p>O.2 Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer. O.2 Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on. O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. O.3 must be available in digital or printed version.</p>		

O.2 Tilføjet nye lægebog for søfarende fra Seahealth

O.2 Add. the new Medical guide for seafarers from Seahealth

O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.		
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog eller Lægebog for Søfarende	1 stk.
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority or Medical guide for seafarers issued by Seahealth	1 pc.
O.3	Fortegnelse, kontrol dokument og brugervejledning (se note)	1 stk kat. A
O.3	Inventory, Control Document and User Instruction (see note)	1 pc. Cat. A
O.5	Radio Medical Optegnelser	1 stk.
O.5	Radio Medical Records	1 pc.
O.2 Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer. O.2 Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on. O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. O.3 must be available in digital or printed version.		

<p>12.5 væske / liquid Lactulose 667 mg/ml Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.6 tablet / tablet Loperamid 2 mg Indikation / Indication: Diaré / Diarrhea Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.7 pulver / powder Glucose / kalium / magnesium / natrium citrat/natrium/ Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium 30/1,1/0,11/2,1 g Indikation / Indication: Væske- og salttab / Rehydration Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.8 kapsler / capsule Omeprazol 20 mg Indikation / Indication: Mavesår / Stomach ulcer Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.9 tablet eller oral opløsning / tablet or oral solution Antacida Indikation / Indication: Sure opstød og halsbrand / acid indigestion and heartburn Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.10 rektalsalve / rectal ointment Glukokortoid Indikation / Indication: Analkløe / Anal pruitis Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: < 25 C</p>
<p>12.12 Tablet / Tablet Domperidon 10 mg Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG table 7,8,10,13,15,20 Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / Storage normal temperatur.</p>
<p>13.2 øjensalve / eyeointment Cinchocain 5 mg/g Indikation / Indication: Lokalbedøvelse af øje / Local anaesthetic of eye Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.3 øjendråber / eyedrops Dexamethason 1 mg/ml Indikation / Indication: Allergi / Regnbuehindebetændelse / Allergic / Inflammatory eye diseases Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.4 øjendråber / eyedrops Pilocarpin 20 mg/ml Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.6 øjensalve / eyeointment Aciclovir 30 mg/g Indikation / Indication: Virusinfektion / Viral infection Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>13.8 øjendråber / eyedrops Fusidinsyre 10mg/g i/in 5g tube Indikation: Øjeninflammation / Inflammation of eye Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read user instruction in the inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur</p>
<p>13.9 væske / liquid Medium til at blødgøre ørevoks/ Medium to soften earwax Indikation / Indication: Blødgøring og løsning af ørevoks / Softening and dissolving of earwax Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.11 øjendråber / eyedrops Tropicamid 1% Indikation / Indication: Øjeninflammation / Inflammation of eye Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>14.1 kapsel / capsule Fluconazol 150 mg Indikation / Indication: Skedesvamp / Vaginal fungus Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>14.2 tablet / tablet Methylergometrin 0,125 mg Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.1 Tablet / Tablet Dextromethorphan 30 mg Indikation / Indication: Hoste / Cough Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.2 turbuhaler / turbuhaler Terbutalin 0,5 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.3 inj.væske / inj.liquid Terbutalin 0,5 mg/ml Indikation / Indication: Astma / Asthma Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.4 turbuhaler / turbuhaler Budesonid 0,2 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.5 næsespray / dråber / nose spray / drops Xylometazolin 1 mg/ml Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>16.1 inf.væske / inf.liquid Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood Ref: Se Fortegnens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

Flushing, intravenous needle	56	Infection of female reproductions organs	26
Fnat	39	Infection, Urinary tract	30
Food substitute	55	Infections, oral cavity	24; 25
Forbrændinger	13	Infections, stomachulcer	25
Forhøjet blodtryk	35; 36; 37	Infektioner, stafylokokker	30
Forkølelse	53	Inflammation i huden	15
Forstoppelse	42	Inflammation of the skin	16
Fortegnelse og kontrol dokument over lægemiddelstoffer	57	Inflammation, eye	48
Fortegnelse og Kontrol dokument over medicinsk udstyr	65	Inflammation, middle ear	24; 25
Fractures	13; 14; 21	Inflammation, throat	24
Frontal sinusitis	53	Inflammatoriske øjensygdomme	49
Fungus	38	Inflammatory eye diseases	49
Furosemid	35; 36	Injuries	14
Furosemide	36	Insect bites	40
Fusidin	48	Insektbid	40
Galdesten	13; 15	Insomnia	23
Gall stone	14; 15	Instrumenter, desinficering	41
Gennemskylning, intravenøskanyle	56	Instruments, Disinfection	41
Gigt	15	Insulin shock	20
Glaucoma	47	Insulinshock	20
Glucagon	20	Insulintilfælde	20
Glucocorticoid group II	40	Intact skin, Disinfection	41
Glucose and sodium chloride.	55	Intakt hud, desinficering	41
Glucose og natriumklorid.	54	Intestinal infections	26
Glukokortikoid gruppe II	40	Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients	57
Glyceryl trinitrate	34	Inventory and Control Document of Medical Equipment	65
Glycerylnitrat	34	Itching, rectum	45
Gonoré	27	Kidney stone	14; 15
Gonorrhoea	27	Klorhexidin.	41
Grøn stær:	47	Klorhexidin/ethanol.	41
Haemorrhoids	45	Kløe, endetarmen	45
Hallucinationer.	22	Kløestillende	11
Hallucinations.	22	Knoglebrud	12
Haloperidol	22	Knogleinfektion	25; 26; 30
Haloperidole.	22	Knoglesmerter	12
Halsbetændelse	24; 25	Kolera	27
Halsbrand	44	Kramper	21
Halsbyld	25; 26; 27	Kramper, forgiftninger	21
Hands, Disinfection	41	Kramper, universelle	21
Hay fever	17	Kvalme	45
Headache	12	Kvalme og opkastninger	22
Heart pain	34; 35; 37	Kvæstelser	13
Heartburn	44	Kæbehulebetændelse	53
Helvedesild	48	Lactulose	42
Herpes	48	Lavt blodsukker	20
High blood pressure	36; 37	Ledscred	21
Hjertekrampe	34; 35	Ledsmerter	12; 15
Hostestillende	51	Legionella	25
Hovedpine	12	Lette til moderate smerter	14
Hudkløe	40	Lice	39
Hudsvamp	38; 50	Lidocain	10; 11
Hudsvie	40	Lidocaine	11
Human tetanus immunoglobulin	29	Local anaesthetic, eye	46
Humant tetanus immunoglobulin	29	Local anaesthetics	11
Hydrocortison.	17	Lokalbedøvelse	10; 11
Hydrocortisonsuccinate	18	Lokalbedøvelse, øjet	46
Hydroxyethyl amyloid.	55	Loperamid	42
Hydroxyethylstivelse.	55	Loperamide.	43
Hypoglycaemic coma	20	Loss of blood	54; 55
Hæmorider	45	Loss of fluid	43
Hænder, desinficering	41	Loss of liquid	54
Høfeber	17	Loss of liquids	55
Ibuprofen.	12; 13	Low blood sugar	20
Imminent premature birth	52	Lung edema	36
Indsovningsbesvær	23		

October 2021 – Version 2.7

Tilføjet Identifikation af skib (Side 1)

Tilføjet 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortison- øredråber

16.3 Hydroxyethylstivelse udgår

Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3

Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning

Tilføjet C.13 Engangsforklæde

Tilføjet F.7 Hypotermi termometer

Tilføjet I.3 Engangskatetre CH 14 til kvinder

Ændret N.1 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- pulver form

Tilføjet N.3 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- væskeform

Added Identification of ship (page 1)

Added 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortisone - eardrops

16.3 Hydroxyethyl amoid is discontinued product

Added 16.6 Gelatine sodium Chlorid replace 16.3

Added B.14 Torniquet to artieriel bleeding

Added C.13 Dispasable apron

Added F.7 Hypotermi thermometer

Added I.3 Catheters for single use, CH 14 for women

Changed N.1 Insecticide, not specified - powder form

Added N.3 Insecticide, not specified - liquid form

August 2021 – Version 2.6

6.3 Diazepam klysma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden

7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet

COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket

6.3 Diazepam enema streingth corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience

7.10 Vaccine Tetanus - label corrected

COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked.

February 2021 – Version 2.5

Tilføjet 8.4 Artemether og lumefantrine i "add medicine covid-19".

Til behandling af Malaria.

Side 101

Add. 8.4 Artemether and lumefantrine in "add medicine covid-19".

For treatment of Malaria.

Page 101

January 2021 - Version 2.4

Tilføjet side med ekstramedicin og medicinsk udstyr i forbindelse med

Covid-19. side 97->

Det er frivilligt om skibet vil medbringe medicinen og udstyr eller dele deraf.

Added page with additional medicine and medical equipment in connection with

Covid-19. Page 97->

It is optional if the ship will bringe the medicine and rquipment or part of it

Ekstra medicin og udstyr pga covid-19 / Extra medicine and equipment due to Covid-19

Tillægsmedicin pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående / Extra medicine due to Covid- 19. It is not mandtory to bring this medicine on bord					
Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quentety A
4.6	H02AB06	Prednisolon	tbl.	25 mg	30 stk.
4.6	H02AB06	Prednisolon	tablets.	25 mg	30 pcs.
5.2	H04AA01	Glucagon "K"	inj. Tørstof + Væske	1 mg	2 stk.
5.2	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	1 mg	2 pcs.
7.14	J01CR02	Amoxicillin/clavulansyre	tbl.	500/125 mg	20 stk.
7.14	J01CR02	Amoxicillin/clavulanacid	tablets.	500/125 mg	20 pcs.
7.15	J01FA10	Azithromycin	tbl.	500 mg	5 x 3stk.
7.15	J01FA10	Azithromycin	tablets.	500 mg	5 x 3 pcs.
8.4	P01BF01	Artemether and lumefantrine *)	tbl.	20 mg / 120 mg	24 stk
8.4	P01BF01	Artemether and lumefantrine *)	tablets.	20 mg / 120 mg	24 pcs
9.7	B01AB10	Tinzaparin	inj	4.500IE	1 boks af 10 stk.
9.7	B01AB10	Tinzaparine	inj.	4.500IE	1 box of 10 pcs.
12.13	A04AA01	Ondasetron	tbl.	4 mg	10 stk.
12.13	A04AA01	Ondasetron	tablets.	4 mg	10 pcs.
12.14	A06AD65	Movicol	oral opløsning	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	4 bokse af 8 stk.
12.14	A06AD65	Movicol	oral solution	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	4 boxes of 8 pcs.
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortison	øredråber	10+2mg/ml	3 x 10 ml
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortisone	eardrops	10+2mg/ml	3 x 10 ml

*) Til højrisiko Malaria områder / High risk Malaria areas

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety A
Tillægsudstyr pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående / Extra equipment due to Covid- 19. It is not mandtory to bring this medicine on bord		
A.19	Iltbrille	2 stk.
A.19	Nasal Cannula	2 pcs.
A.20	Venturi iltmaske med sæt af justerbare diluter	2 sæt
A.20	Venturi oxygen mask with set of adjustable dilutes	2 sets
G.8	Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)	5 stk.
G.8	Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)	5 pcs.
G.9	Hurtig test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab) * Se note	10 stk.
G.9	Rapid test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab)* See note	10 pcs.

Følg producentens vejledning. Se digital vejledning/e-learning på producentens hjemmeside.
Follow the manufacturer's guideline. See digital guideline / E-learning on manufacturer's website

Brugervejledninger / User instruction

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness			
Allergiske reaktioner, hævelser osv. Oral behandling Covid-19	4.6	Lægemiddelstof:	Prednisolon
		Form:	Tabletter á 25 mg
		Virkning:	Bremser allergiske reaktioner, hævelser.
		Dosering:	Efter ordination af Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Forhøjet tryk i øjet, slører infektion. Infektion
	H02AB06	Holdbarhed:	2 år fra produktions dato (Prednisolon, Actavis)
		Opbevaring:	normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical.	
Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred. Partly COVID spin off.	4.6	Active Pharmaceutical ingredients:	Prenisolon
		Form:	Tablets of 25 mg
		Effect:	Brakes allergic reation, swelling etc.
		Dosage:	After precipstion from Radio Medical
	ATC	Side-effects:	Glaucoma, blurs infections, infekctions
	H02AB06	Validity:	2 years from production date (Prednisolon, Actavis)
		Storage:	normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical Denmark	

4.6 Tablet / Tablets
 Prednisolon 25 mg
 Indikation / Indication Allergi / Allergy
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 5. Antidoter / Antidotes

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	Lægemiddelstof:	Glucagon.
		Form:	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml steril vand til intramuskulært brug.
		Virkning:	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5- 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.
		Dosering:	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 -15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
	ATC	Bivirkninger:	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).
	H04AA01	Holdbarhed:	Holdbarhed: Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2 - 8°C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
	Opbevaring:	Almindelig temperatur eller 2 - 8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).	
	Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical. Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.	
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Glucagon.
		Form:	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		Effect:	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		Dosage:	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
	ATC	Side-effects:	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).
	H04AA01	Validity:	At room temperature: 18 months from the date of production (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		Storage:	Normal temperature or 2-8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).
	Remarks:	Consult Radio Medical. If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.	

5.2 inj.substans. / inj,substance
 Glucagon 1mg
 Indikation / Indication: Lav blodsukker / Low
 bloodsugarRef: Se Fortegnelse brugervejledning /
 Read the user instruction in the InventorySøg samråd
 med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal
 temperature

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections

Kemisk Lungebetændelse	7.14	Lægemiddelstof:	Amoxicillin/clavulansyre
		Form:	Tablets 500+125 mg
		Virkning:	Prevent inflammation. Kills bacteria
		Dosering:	500 mg x 3 times daily
	ATC	Bivirkninger:	Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning. Kløe, hududslæt, svamp i munden
	J01CJ02	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS)
		Opbevaring:	Normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Allergisk shock er meget sjældent og forekommer normalt inden for 30 minutter efter administration. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulær. (4.1)	
MFAG table 9 Pneumonia after inhalation of poisonous chemical substances	7.14	Active Pharmaceutical ingredients:	Amoxicillin/clavulanacid
		Form:	Tablets 500+125 mg
		Effect:	Prevent inflammation. Kills bacteria
		Dosage:	500 mg x 3 times daily
	ATC	Side-effects:	Diarrhea, Abdominal pain, Nausea, Vomiting. Itching, Skin rash, Fungus in the mouth
	J01CJ02	Validity:	3 years from the date of production (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical. Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)	
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner Alternativ til penicillin ved allergi MFAG tabel 9	7.15	Lægemiddelstof:	Azithromycin
		Form:	Tabletter 500mg
		Virkning:	Standser bakteriernes vækst
		Dosering:	Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt.
	ATC	Bivirkninger:	Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kraftsløshed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt.
	J01FA10	Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical	
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer Alternative to penicillin in case of allergy MFAG table 9	7.15	Active Pharmaceutical ingredients:	Azithromycin
		Form:	Tablets of 500mg
		Effect:	Stops bacterial growth
		Dosage:	Adults: 500 mg x 1-2 daily
	ATC	Side-effects:	Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness, dizziness, taste disturbances, headache, itchy skin and skin rash.
	J01FA10	Validity:	5 years from date of production (Azithromycin, KRKA)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical	

7.14 Tablet / Tablets
 Amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg
 Indikation / Indication: Infektioner / Infections
 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

7.15 Tablet / Tablets
 Azithromycin 500 mg
 Indikation / Indication: Infektioner / Infections
 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 8. Malaria – behandling / Malaria – Treatment

Til behandling af P. Falciparum malaria. På baggrund af: Positiv malaria test for P. Falciparum eller almen sygdomsfornemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria	8.4	Lægemiddelstof:	Artemether and lumefantrine
		Form:	Tabletter á 20 mg / 120 mg
		Virkning:	Dræbermalaria parasitterne
		Dosering:	Efter kontakt med Radio Medical Danmark. Start omgående med 4 tbl. Derefter: 4 tabl 8 timer efter første dosis 4 tabl 24 timer efter første dosis. 4 tbl. 36 timer efter første dosis. 4 tbl. 48 timer efter første dosis. 4 tbl. 60 timer efter første dosis.
		ATC	Bivirkninger:
Treatment of P. Falciparum malaria Based on: Positive Malaria Test for P. Falciparum or general malaise and fever combined with relevant risk of malaria	8.4	Active Pharmaceutical ingredients:	Artemether and lumefantrine
		Form:	Tablets 20 mg / 120 mg
		Effect:	Kills the malaria parasite
		Dosage:	Consult Radio Medical Danmark 4 tablets as soon as possible Then: 4 tablets 8 hours later, then 4 tablets 24 hours after the first dose, then 4 tablets 36 hours after the first dose, then 4 tablets 48 hours after the first dose and then 4 tablets 60 hours after the first dose.
ATC	Side-effects:	Gastrointestinal disorders, itchy skin, skin rash, headache and dizziness.	
P01BF01	Validity:	2 years from production date (Riamet®, Novatis)	
	Storage:	Do not store above 30°C	
	Remarks:	Consult Radio Medical regardless of the result of the malaria test.	

8.4 tablet / tablet
 Artemether and lumefantrine 20 mg / 120 mg
 Indikation / Indication: Malaria behandling / Malaria treatment
 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: ikke over 30° C /Not above 30° C

Grp. 9 Hjerne / Cardiac			
Blodfortynding	9.7	Lægemiddelstof:	Tinzaparin
		Form:	Injektion 4500IE
		Virkning:	Blodfortynding
		Dosering:	Efter ordination af Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Blødningstendens, blodmangel, irritation ved indstiksstedet, Hæmatomer
	B01AB10	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Innohep, Paranova, Danmark)
		Opbevaring:	Ikke over 25 °C
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Blood diluting	9.7	Active Pharmaceutical ingredients:	Tinzaparine
		Form:	Injection 4500IE
		Effect:	Blood diluting
		Dosage:	After prescription from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Bleeding tendency, anemia, injection site irritation, Hematomas.
	B01AB10	Validity:	3 years from production date (Innohep, Paranova, Danmark)
		Storage:	Not above 25 °C
		Remarks:	Consult Radio Medical Danmark

9.7 Inj. / inj.

Tinzaparine 4500IE

Indikation / Indication: Blodfortynding / Blood diluting
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal				
Kvalme Opkastninger MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.13	Lægemiddelstof:	Ondansetron	
		Form:	Tabeletter 4 mg	
		Virkning:	Modvirker kvalme og opkast	
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical Danmark	
	ATC	Bivirkninger:	Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmfølelse	
	A04AA01	Holdbarhed:	5 år fra produktions dato (Aurobindo Pharma)	
		Opbevaring:	Normal temperatur	
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark		
Nausea Vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.13	Active Pharmaceutical ingredients:	Ondansetron	
		Form:	Tablets 4 mg	
		Effect:	Prevent Nausea and vomiting	
		Dosage:	By prescription from Radio Medical Danmark	
	ATC	Side-effects:	Headache, Constipation, Redness and warm feeling	
	A04AA01	Validity:	5 years from production date (Aurobindo Pharma)	
		Storage:	Normal temperature	
Remarks:		Consult Radio Medical Danmark		
Forstoppelse	12.14	Lægemiddelstof:	Movicol®	
		Form:	Pulver til oral opløsning	
		Virkning:	Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres	
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical Danmark	
	ATC	Bivirkninger:	Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.	
	A03FA03	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Norgine BV)	
		Opbevaring:	Ikke over 25 °C	
Anmærkninger:		søg samråd med Radio Medical		
Constipation	12.14	Active Pharmaceutical ingredients:	Movicol®	
		Form:	Powder for oral solution	
		Effect:	Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools	
		Dosage:	By prescripstion from Radio Medical Danmark	
	ATC	Side-effects:	Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, Meteorism, Vomiting.	
	A03FA03	Validity:	3 years from production date (Norgine BV)	
		Storage:	Not above 25 °C	
Remarks:		Consult Radio Medical		

12.13 Tablet / Tablets
Ondasetron 4 mg
 Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20
 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / Storage normal temperatur.

12.14 Pulver / Power
Movicol
 Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation
 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Øregangs eksem	13.12	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin / Hydrocortison
		Form:	Øredråber
		Virkning:	Behandling af øregangs eksem
		Dosering:	3 dråber i berørte øre 2 gange daglig
	ATC	Bivirkninger:	Ørekløe, øresmerter, svimmelhed
	S01FA06	Holdbarhed:	Ubrudt 2 år fra produktionsdato (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Opbevaring:	Beskytte mod lys og ikke over 25 c. Må ikke opbevares i køleskab.
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Ear eczema	13.12	Active Pharmaceutical ingredients:	Ciprofloxacin / Hydrocortisone
		Form:	Eardrops
		Effect:	Treatment of ear canal eczema
		Dosage:	3 drops in affected ear twice daily
	ATC	Side-effects:	Ear itching, earache, dizziness
	S01FA06	Validity:	Unbroken 2 years from production date (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Storage:	Protect from light and not more than 25 c. Do not refrigerate.
Remarks:		Consult Radio Medical Danmark	

13.12 Øredråber / Eardrops

Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg

Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema

Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket.
 COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked.

Ekstra medicin og udstyr pga covid-19 /

Extra medicine and equipment due to Covid-19

Tillægsmedicin pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående / Extra medicine due to Covid- 19. It is not mandatory to bring below medicine on bord					
Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quentety A
4.6	H02AB06	Prednisolon	tbl.	25 mg	30 stk.
4.6	H02AB06	Prednisolon	tablets.	25 mg	30 pcs.
5.2	H04AA01	Glucagon "K"	inj. Tørstof + Væske	1 mg	2 stk.
5.2	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	1 mg	2 pcs.
7.14	J01CR02	Amoxicillin/clavulansyre	tbl.	500/125 mg	20 stk.
7.14	J01CR02	Amoxicillin/clavulanacid	tablets.	500/125 mg	20 pcs.
7.15	J01FA10	Azithromycin	tbl.	500 mg	5 x 3stk.
7.15	J01FA10	Azithromycin	tablets.	500 mg	5 x 3 pcs.
8.4	P01BF01	Artemether and lumefantrine *)	tbl.	20 mg / 120 mg	24 stk
8.4	P01BF01	Artemether and lumefantrine *)	tablets.	20 mg / 120 mg	24 pcs
9.7	B01AB10	Tinzaparin	inj	4.500IE	1 boks af 10 stk.
9.7	B01AB10	Tinzaparine	inj.	4.500IE	1 box of 10 pcs.
12.13	A04AA01	Ondasetron	tbl.	4 mg	10 stk.
12.13	A04AA01	Ondasetron	tablets.	4 mg	10 pcs.
12.14	A06AD65	Movicol	oral opløsning	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	4 bokse af 8 stk.
12.14	A06AD65	Movicol	oral solution	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	4 boxes of 8 pcs.
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortison	øredråber	10+2mg/ml	3 x 10 ml
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortisone	eardrops	10+2mg/ml	3 x 10 ml

*) Til højrisiko Malaria områder / High risk Malaria areas

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety A
Tillægsudstyr pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående / Extra equipment due to Covid- 19. It is not mandatory to bring below medical equipment on board		
A.19	Iltbrille	2 stk.
A.19	Nasal Cannula	2 pcs.
A.20	Venturi iltmaske med sæt af justerbare diluter	2 sæt
A.20	Venturi oxygen mask with set of adjustable dilutes	2 sets
G.8	Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)	5 stk.
G.8	Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)	5 pcs.
G.9	Hurtig test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab) * Se note	10 stk.
G.9	Rapid test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab)* See note	10 pcs.

Følg producentens vejledning. Se digital vejledning/e-learning på producentens hjemmeside. Testen skal være CE mærket.
 Follow the manufacturer's guideline. See digital guideline / E-learning on manufacturer's website. The quick test have to be CE marked.

Brugervejledninger / User instruction

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness			
Allergiske reaktioner, hævelser osv. Oral behandling Covid-19	4.6	Lægemiddelstof:	Prednisolon
		Form:	Tabletter á 25 mg
		Virkning:	Bremser allergiske reaktioner, hævelser.
		Dosering:	Efter ordination af Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Forhøjet tryk i øjet, slører infektion. Infektion
	H02AB06	Holdbarhed:	2 år fra produktions dato (Prednisolon, Actavis)
		Opbevaring:	normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical.	
Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred. Partly COVID spin off.	4.6	Active Pharmaceutical ingredients:	Prenisolon
		Form:	Tablets of 25 mg
		Effect:	Brakes allergic reation, swelling etc.
		Dosage:	After precipstion from Radio Medical
	ATC	Side-effects:	Glaucoma, blurs infections, infekctions
	H02AB06	Validity:	2 years from production date (Prednisolon, Actavis)
		Storage:	normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical Denmark	

4.6 Tablet / Tablets

Prednisolon 25 mg

Indikation / Indication Allergi / Allergy

Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 5. Antidoter / Antidotes

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	Lægemiddelstof:	Glucagon.
		Form:	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml steril vand til intramuskulært brug.
		Virkning:	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5- 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.
		Dosering:	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 -15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
	ATC	Bivirkninger:	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).
	H04AA01	Holdbarhed:	Holdbarhed: Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2 - 8°C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
	Opbevaring:	Almindelig temperatur eller 2 - 8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).	
	Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical. Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.	
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Glucagon.
		Form:	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		Effect:	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		Dosage:	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
	ATC	Side-effects:	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).
	H04AA01	Validity:	At room temperature: 18 months from the date of production (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		Storage:	Normal temperature or 2-8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).
	Remarks:	Consult Radio Medical. If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.	

5.2 inj.substans. / inj,substance
 Glucagon 1mg
 Indikation / Indication: Lav blodsukker / Low bloodsugar
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the InventorySøg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections

Kemisk Lungebetændelse	7.14	Lægemiddelstof:	Amoxicillin/clavulansyre
		Form:	Tablets 500+125 mg
		Virkning:	Prevent inflammation. Kills bacteria
		Dosering:	500 mg x 3 times daily
	ATC	Bivirkninger:	Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning. Kløe, hududslæt, svamp i munden
	J01CJ02	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS)
		Opbevaring:	Normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Allergisk shock er meget sjældent og forekommer normalt inden for 30 minutter efter administration. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulær. (4.1)	
MFAG table 9 Pneumonia after inhalation of poisonous chemical substances	7.14	Active Pharmaceutical ingredients:	Amoxicillin/clavulanacid
		Form:	Tablets 500+125 mg
		Effect:	Prevent inflammation. Kills bacteria
		Dosage:	500 mg x 3 times daily
	ATC	Side-effects:	Diarrhea, Abdominal pain, Nausea, Vomiting. Itching, Skin rash, Fungus in the mouth
	J01CJ02	Validity:	3 years from the date of production (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical. Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)	
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner Alternativ til penicillin ved allergi MFAG tabel 9	7.15	Lægemiddelstof:	Azithromycin
		Form:	Tabletter 500mg
		Virkning:	Standser bakteriernes vækst
		Dosering:	Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt.
	ATC	Bivirkninger:	Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kraftsløshed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt.
	J01FA10	Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical	
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer Alternative to penicillin in case of allergy MFAG table 9	7.15	Active Pharmaceutical ingredients:	Azithromycin
		Form:	Tablets of 500mg
		Effect:	Stops bacterial growth
		Dosage:	Adults: 500 mg x 1-2 daily
	ATC	Side-effects:	Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness, dizziness, taste disturbances, headache, itchy skin and skin rash.
	J01FA10	Validity:	5 years from date of production (Azithromycin, KRKA)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical	

7.14 Tablet / Tablets
Amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg
Indikation / Indication: Infektioner / Infections
Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

7.15 Tablet / Tablets
Azithromycin 500 mg
Indikation / Indication: Infektioner / Infections
Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 8. Malaria – behandling / Malaria – Treatment

Til behandling af P. Falciparum malaria. På baggrund af: Positiv malaria test for P. Falciparum eller almen sygdomsfornemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria	8.4	Lægemiddelstof:	Artemether and lumefantrine
		Form:	Tabletter á 20 mg / 120 mg
		Virkning:	Dræbermalaria parasitterne
		Dosering:	Efter kontakt med Radio Medical Danmark. Start omgående med 4 tbl. Derefter: 4 tabl 8 timer efter første dosis 4 tabl 24 timer efter første dosis. 4 tbl. 36 timer efter første dosis. 4 tbl. 48 timer efter første dosis. 4 tbl. 60 timer efter første dosis.
		ATC	Bivirkninger:
Treatment of P. Falciparum malaria Based on: Positive Malaria Test for P. Falciparum or general malaise and fever combined with relevant risk of malaria	8.4	Active Pharmaceutical ingredients:	Artemether and lumefantrine
		Form:	Tablets 20 mg / 120 mg
		Effect:	Kills the malaria parasite
		Dosage:	Consult Radio Medical Danmark 4 tablets as soon as possible Then: 4 tablets 8 hours later, then 4 tablets 24 hours after the first dose, then 4 tablets 36 hours after the first dose, then 4 tablets 48 hours after the first dose and then 4 tablets 60 hours after the first dose.
ATC	Side-effects:	Gastrointestinal disorders, itchy skin, skin rash, headache and dizziness.	
P01BF01	Validity:	2 years from production date (Riamet®, Novatis)	
	Storage:	Do not store above 30°C	
	Remarks:	Consult Radio Medical regardless of the result of the malaria test.	

8.4 tablet / tablet
Artemether and lumefantrine 20 mg / 120 mg
Indikation / Indication: Malaria behandling / Malaria treatment
Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
Opbevaring / storage: ikke over 30° C /Not above 30° C

Grp. 9 Hjerte / Cardiac			
Blodfortynding	9.7	Lægemiddelstof:	Tinzaparin
		Form:	Injektion 4500IE
		Virkning:	Blodfortynding
		Dosering:	Efter ordination af Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Blødningstendens, blodmangel, irritation ved indstiksstedet, Hæmatomer
	B01AB10	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Innohep, Paranova, Danmark)
		Opbevaring:	Ikke over 25 °C
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Blood diluting	9.7	Active Pharmaceutical ingredients:	Tinzaparine
		Form:	Injection 4500IE
		Effect:	Blood diluting
		Dosage:	After prescription from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Bleeding tendency, anemia, injection site irritation, Hematomas.
	B01AB10	Validity:	3 years from production date (Innohep, Paranova, Danmark)
		Storage:	Not above 25 °C
		Remarks:	Consult Radio Medical Danmark

9.7 Inj. / inj.

Tinzaparine 4500IE

Indikation / Indication: Blodfortynding / Blood diluting
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal			
Kvalme Opkastninger MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.13	Lægemiddelstof:	Ondansetron
		Form:	Tabeletter 4 mg
		Virkning:	Modvirker kvalme og opkast
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmfølelse
	A04AA01	Holdbarhed:	5 år fra produktions dato (Aurobindo Pharma)
		Opbevaring:	Normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Nausea Vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.13	Active Pharmaceutical ingredients:	Ondansetron
		Form:	Tablets 4 mg
		Effect:	Prevent Nausea and vomiting
		Dosage:	By prescription from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Headache, Constipation, Redness and warm feeling
	A04AA01	Validity:	5 years from production date (Aurobindo Pharma)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical Danmark	
Forstoppelse	12.14	Lægemiddelstof:	Movicol®
		Form:	Pulver til oral opløsning
		Virkning:	Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
	A03FA03	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Norgine BV)
		Opbevaring:	Ikke over 25 °C
Anmærkninger:		søg samråd med Radio Medical	
Constipation	12.14	Active Pharmaceutical ingredients:	Movicol®
		Form:	Powder for oral solution
		Effect:	Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools
		Dosage:	By prescripstion from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, Meteorism, Vomiting.
	A03FA03	Validity:	3 years from production date (Norgine BV)
		Storage:	Not above 25 °C
Remarks:		Consult Radio Medical	

12.13 Tablet / Tablets

Ondasetron 4 mg

Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
Opbevaring / Storage normal temperatur.

12.14 Pulver / Power

Movicol

Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Øregangs eksem	13.12	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin / Hydrocortison
		Form:	Øredråber
		Virkning:	Behandling af øregangs eksem
		Dosering:	3 dråber i berørte øre 2 gange daglig
	ATC	Bivirkninger:	Ørekløe, øresmerter, svimmelhed
	S01FA06	Holdbarhed:	Ubrudt 2 år fra produktionsdato (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Opbevaring:	Beskytte mod lys og ikke over 25 c. Må ikke opbevares i køleskab.
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Ear eczema	13.12	Active Pharmaceutical ingredients:	Ciprofloxacin / Hydrocortisone
		Form:	Eardrops
		Effect:	Treatment of ear canal eczema
		Dosage:	3 drops in affected ear twice daily
	ATC	Side-effects:	Ear itching, earache, dizziness
	S01FA06	Validity:	Unbroken 2 years from production date (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Storage:	Protect from light and not more than 25 c. Do not refrigerate.
Remarks:		Consult Radio Medical Danmark	

13.12 Øredråber / Eardrops

Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg

Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema

Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical