

Tilføjet "Id of ship" (side 3)  
Added "Id of ship" (page 3)

## Identifikation af skib / Identification of ship

Skibsnavn / *Ship Name*: \_\_\_\_\_

Kaldesignal / *Call Signal*: \_\_\_\_\_

IMO nummer / *IMO Number*: \_\_\_\_\_

Hjemmehavn / *Port of Reg.*: \_\_\_\_\_

### 6.3 Diazepam klysma – styrke ændret til 5 mg/ml

| Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion                                                |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universelle kramper<br>Kramper fra forgiftninger<br>Abstinenskramper<br>Epilepsi<br><br>Akut sindsyge<br><br>MFAG tabel 4, 5, 6 | 6.3 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Diazepam $\Delta$ .                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                 |     | <b>Form:</b>           | Klysma, 5 mg/ml, til anvendelse i endetarmen                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |     | <b>Virkning:</b>       | Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed.<br>Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter. |
|                                                                                                                                 |     | <b>Dosering:</b>       | Efter samråd med Radio Medical - 1 klysma tømmes i endetarmen.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                 |     | <b>Bivirkninger:</b>   | Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |     | <b>Holdbarhed:</b>     | 2,5 år fra produktionsdato (Stesolid®, Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |     | <b>Opbevaring:</b>     | Almindelig temperatur..                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |     | <b>Anmærkninger:</b>   | Søg samråd med <i>Radio Medical</i>                                                                                                                                                                                                                                          |

26

### 6.3 Diazepam enema – strength changed to 5 mg/ml

| Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)                                                         |     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universal convulsions<br>Convulsions caused by poisoning<br>Withdrawal convulsions<br>Epilepsy<br><br>Acute mental illness<br><br>MFAG tabel 4, 5, 6 | 6.3 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Diazepam. $\Delta$                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Form:</b>                              | Enema, 5 mg /ml, for insertion into the rectum.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Effect:</b>                            | Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness.<br>Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives. |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Dosage:</b>                            | After consult with Radio Medical - 1 enema emptied into the rectum.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Side-effects:</b>                      | Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Validity:</b>                          | 2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                                                                    |

27

### 6.3 Diazepam klysma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden

| Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion                                                |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universelle kramper<br>Kramper fra forgiftninger<br>Abstinenskramper<br>Epilepsi<br><br>Akut sindsyge<br><br>MFAG tabel 4, 5, 6 | 6.3 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Diazepam Δ.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |     | <b>Form:</b>           | Klysma, 4 mg/ml, til anvendelse i endetarmen                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |     | <b>Virkning:</b>       | Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed.<br>Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter. |
|                                                                                                                                 |     | <b>Dosering:</b>       | Efter samråd med Radio Medical - 1 klysma tømmes i endetarmen.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                 |     | <b>Bivirkninger:</b>   | Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |     | <b>Holdbarhed:</b>     | 2,5 år fra produktionsdato (Stesolid®, Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |     | <b>Opbevaring:</b>     | Almindelig temperatur..                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |     | <b>Anmærkninger:</b>   | Søg samråd med <i>Radio Medical</i>                                                                                                                                                                                                                                          |

26

### 6.3 Diazepam enema streingth corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience

| Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)                                                         |     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universal convulsions<br>Convulsions caused by poisoning<br>Withdrawal convulsions<br>Epilepsy<br><br>Acute mental illness<br><br>MFAG tabel 4, 5, 6 | 6.3 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Diazepam.Δ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Form:</b>                              | Enema, 4 mg /ml, for insertion into the rectum.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Effect:</b>                            | Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness.<br>Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives. |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Dosage:</b>                            | After consult with Radio Medical - 1 enema emptied into the rectum.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Side-effects:</b>                      | Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Validity:</b>                          | 2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                      |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                                                                    |

27

7.1 Phenoxymethylpenicillin styrken er ændret til 660 mg - 800 mg

7.1 Phenoxymethylpenicillin strenght change to 660 mg - 800 mg

| Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections                                                                             |     |                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halsbetændelse<br>Mundhuleinfektioner<br>Bihulebetændelse<br>Mellemørebetændelse<br>Lungebetændelse                     | 7.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Phenoxymethylpencillin                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                         |     | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 660 - 800 mg (ca.1 mill. IE)                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                         |     | <b>Virkning:</b>                          | Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene                                                                                                        |
|                                                                                                                         |     | <b>Dosering:</b>                          | 400 mg – 800 mg × 2 – 4 dagligt                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         |     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme, diarré og hududslæt.<br>Sjældent ses overfølsomhedsshock                                                                                                                          |
|                                                                                                                         |     | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Primcillin®, MEDA)                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         |     | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                         |     | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift.<br>Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1) |
| Inflammation of the throat<br>Infections of the oral cavity<br>Sinusitis<br>Inflammation of the middle ear<br>Pneumonia | 7.1 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Phenoxymethylpenicillin.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                         |     | <b>Form:</b>                              | Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU)                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                         |     | <b>Effect:</b>                            | Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.                                                                                                               |
|                                                                                                                         |     | <b>Dosage:</b>                            | 400-800 mg × 2-4 times daily                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         |     | <b>Side-effects:</b>                      | Vomiting, diarrhoea and rash.<br>Rarely allergic shock                                                                                                                                    |
|                                                                                                                         |     | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production ( Primcillin®, MEDA)                                                                                                                                  |
|                                                                                                                         |     | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                         |     | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration.<br>Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)               |

7.10 Tetanus vaccine ændre til Tetanusholdig vaccine  
7.10 Tetanus vaccine change to Vaccine containing Tetanus.

| Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections (continued)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>                                                         | 7.10 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Virkning:</b>                          | Aktiverer patientens immunsystem.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Dosering:</b>                          | Følg ordination fra Radio Medical                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Lokal rødme, hævelse og ømhed.<br>Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn.<br>Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Opbevares køligt mellem 2 - 8° C.<br>Frossen vaccine må ikke anvendes.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                   |
| <p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p> | 7.10 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Form:</b>                              | Injection liquid                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Effect:</b>                            | Activates the patient's immune system.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Dosage:</b>                            | Follow prescription from Radio Medical                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Side-effects:</b>                      | Local blushing, swelling, and soreness.<br>Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day.<br>Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Storage:</b>                           | To be stored cool at between 2-8°C.<br>Frozen vaccine must not be used.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                          |

7.10 Tetanus holdig vaccine – styrke og ATC kode fjernet, da det kommer an på hvad der udleveres - følg råd fra Radio Medical

7.10 Tetanus-containing vaccine – strength and ATC code removed, as it depends on what is delivered - follow advice from Radio Medical

| Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | (continued)                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>                                                         | 7.10 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Virkning:</b>                          | Aktiverer patientens immunsystem.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Dosering:</b>                          | Følg ordination fra Radio Medical                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.                                                                                                                                               |
| <p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p> | 7.10 | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Form:</b>                              | Injection liquid                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Effect:</b>                            | Activates the patient's immune system.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Dosage:</b>                            | Follow prescription from Radio Medical                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Side-effects:</b>                      | Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Storage:</b>                           | To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                    |

7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet  
7.10 Vaccine Tetanus - label corrected

| Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections (continued)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stivkrampevaccine</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11).</p> <p>Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.</p>                                                         | 7.10 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Form:</b>                              | Injektionsvæske                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Virkning:</b>                          | Aktiverer patientens immunsystem.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Dosering:</b>                          | Følg ordination fra Radio Medical                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Lokal rødme, hævelse og ømhed.<br>Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn.<br>Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Opbevares køligt mellem 2 - 8° C.<br>Frossen vaccine må ikke anvendes.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                   |
| <p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p> | 7.10 | <b>Active pharmaceutical ingredients:</b> | Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Form:</b>                              | Injection liquid                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Effect:</b>                            | Activates the patient's immune system.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Dosage:</b>                            | Follow prescription from Radio Medical                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Side-effects:</b>                      | Local blushing, swelling, and soreness.<br>Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day.<br>Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Validity:</b>                          | 2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Storage:</b>                           | To be stored cool at between 2-8°C.<br>Frozen vaccine must not be used.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                                                                          |

| Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears (continued)                                                                                                                           |       |                                           |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenbetændelse<br>Betændelse i øjenlåg og øjets omgivelser.<br>Forebyggelse af betændelse efter øjenundersøgelse og fjernelse af fremmedlegemer.<br><br>MFAG appendiks 7.                    | 13.8  | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Fusidin                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Form:</b>                              | Øjendråber / øjen gel 1%                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Virkning:</b>                          | Bakteriedræbende                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Dosering:</b>                          | 1 dråbe x 2 dagligt                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Øjenirritation, øjenkløe og rødme                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato, (Fucithalmic, 2care4 ApS)                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.                                                |
| Inflammation of the eyes.<br>Inflammation of the eyelid, and the surroundings of the eye.<br>Prevention of inflammation of the eyes after removal of foreign bodies.<br><br>MFAG appendiks 7 | 13.8  | Active Pharmaceutical ingredients:        | Fusidin                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |       | Form:                                     | Eye drops / Eye gel 1 %                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |       | Effect:                                   | Kills bacteria                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                              |       | Dosage:                                   | 1 drop twice daily                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              |       | Side-effects:                             | Irritation of the eye, eye itching and blushing.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              |       | Validity:                                 | 3 years from the date of production (Fucithalmic, 2care4 ApS)                                                                       |
|                                                                                                                                                                                              |       | Storage:                                  | Normal temperature                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              |       | Remarks:                                  | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used in connection with contact lenses                                                  |
| Lokal inflammatoriske øjenbehandling<br>Øregangseksen                                                                                                                                        | 13.10 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Form:</b>                              | Øjendråber 15+5+1 mg/ml                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Virkning:</b>                          | Hæmmer bakterievækst og modvirker kløe                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Dosering:</b>                          | Øjendråber: 1 dråbe 3 gange dagligt<br>Øredråber: 2-4 dråber 3 gange dagligt i øregange                                             |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Bivirkninger:</b>                      | Lokal irritation. Forøgelse af trykket i øjet                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktionsdato (Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb. Pfizer)<br>Må anvendes en måned efter åbning           |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical<br>Må aldrig anvendes i øregang, dersom der er mistanke om perforeret trommehinde.                     |
| Inflammatory eye treatment<br>Ear Eczema                                                                                                                                                     | 13.10 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B comb.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Form:</b>                              | Eye drops 15+5+1 mg/ml                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Effect:</b>                            | Inhibits bacterial growth and inhibits itching                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Dosage:</b>                            | Eye drops: 1 drop three times a day<br>Ear drops: 2-4 drops three times daily in the ear canal                                      |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Side-effects:</b>                      | Local irritation. Increasing the pressure in the eye                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Validity:</b>                          | 2 years from date of production (Hydrocortisone with Terramycin® and Polymyxin B comb. Pfizer)<br>May be used a month after opening |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              |       | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical.<br>Never use in the ear canal, where it is suspected perforated eardrum.                                     |

### Grp. 14. Gynækologiske midler / Gynaecological agents

|                                            |      |                                           |                                                                                       |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Blødning EFTER abort eller fødsel          | 14.2 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Methylergometrin.                                                                     |
|                                            |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter à 0,125 mg.                                                                 |
|                                            |      | <b>Virkning:</b>                          | Livmodersammentrækkende.                                                              |
|                                            |      | <b>Dosering:</b>                          | Efter abort eller fødsel:<br>0,125 - 0,250 mg 3 gange dagligt.                        |
|                                            |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Overfølsomhed, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslæt.                  |
|                                            |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).                                      |
|                                            |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.                                                                |
|                                            |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .<br>Må ikke anvendes til gravide med blødninger. |
| Bleeding AFTER giving birth or miscarriage | 14.2 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Methylergometrine.                                                                    |
|                                            |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 0,125 mg.                                                                  |
|                                            |      | <b>Effect:</b>                            | Contracts the uterus.                                                                 |
|                                            |      | <b>Dosage:</b>                            | After giving birth or miscarriage:<br>0.125-0.250 mg three times daily                |
|                                            |      | <b>Side-effects:</b>                      | Allergy, headache, stomach ache, high blood pressure, rash.                           |
|                                            |      | <b>Validity:</b>                          | 5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).                          |
|                                            |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                                                   |
|                                            |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>Not to be used by pregnant women who are bleeding.  |

### Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma

|                |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hostestillende | 15.1 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Dextromethorphan.                                                                                                                                                                                                                         |
|                |      | <b>Form:</b>                              | Tabletter á 30 mg                                                                                                                                                                                                                         |
|                |      | <b>Virkning:</b>                          | Hostestillende.                                                                                                                                                                                                                           |
|                |      | <b>Dosering:</b>                          | 15-30 mg. 3-4 gange daglig                                                                                                                                                                                                                |
|                |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ufrivillige muskelsammentrækning, døsighed, svimmelhed, hallucinationer, mani.                                                                                                                                                            |
|                |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Dexofan® Nycomed)                                                                                                                                                                                               |
|                |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.                                                                                                                                                                                                                    |
|                |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Bør ikke anvendes af børn under 6 år<br>Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med 7.7 Metronidazol.<br>Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med Disulfiram (Antabus®)                                                            |
| Cough          | 15.1 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Dextromethorphan.                                                                                                                                                                                                                         |
|                |      | <b>Form:</b>                              | Tablets of 30 mg                                                                                                                                                                                                                          |
|                |      | <b>Effect:</b>                            | Reduces coughs.                                                                                                                                                                                                                           |
|                |      | <b>Dosage:</b>                            | 15 – 30 mg. 3-4 times daily                                                                                                                                                                                                               |
|                |      | <b>Side-effects:</b>                      | Unvoluntary muscle contraction, drowsiness, dizziness, hallucinations and mania.                                                                                                                                                          |
|                |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Dexofan®, Nycomed).                                                                                                                                                                                  |
|                |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                                                                                                                                                                                                       |
|                |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical.<br>Should not be used by children under the age of 6 years<br>Should not be used during concomitant treatment or 7.7 Metronidazole.<br>Should not be used during concomitant treatment with disulfiram (Antabuse®) |

### 16.3 Hydroxyethylstivelse udgår

### 16.3 Hydroxyethyl amoid is discontinued product

| Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (continued)      |      |                                           |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Food substitute<br>Loss of liquids<br><br>(See also 12.7)                           | 16.2 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Glucose and sodium chloride.                                                                                                                                   |
|                                                                                     |      | <b>Form:</b>                              | Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.                                          |
|                                                                                     |      | <b>Effect:</b>                            | Replaces liquids, glucose and salts.                                                                                                                           |
|                                                                                     |      | <b>Dosage:</b>                            | Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.                                                                            |
|                                                                                     |      | <b>Side-effects:</b>                      | None relevant.                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Natriumklorid-Glucose" Braun", B. Braun Medical A/S).                                                                     |
|                                                                                     |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                                                                                                                            |
|                                                                                     |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .<br>In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4). |
| Væske til gennemskylning af intravenøs kanyle.<br>Sårbehandling.<br>Øjenbehandling  | 16.5 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Natriumklorid                                                                                                                                                  |
|                                                                                     |      | <b>Form:</b>                              | Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder                                                                                                                                |
|                                                                                     |      | <b>Virkning:</b>                          | Fjerner blod fra venekanyale, renses sår og øjne                                                                                                               |
|                                                                                     |      | <b>Dosering:</b>                          | Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra Radio Medical                                                                               |
|                                                                                     |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ingen relevante                                                                                                                                                |
|                                                                                     |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi)                                                                                                                      |
|                                                                                     |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur                                                                                                                                          |
|                                                                                     |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                          |
| Fluid for flushing intravenous needle.<br>Treatment of wounds.<br>Treatment of eyes | 16.5 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Sodium chloride                                                                                                                                                |
|                                                                                     |      | <b>Form:</b>                              | Fluid 0,9 % in containers of 20 ml                                                                                                                             |
|                                                                                     |      | <b>Effect:</b>                            | Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes                                                                                                   |
|                                                                                     |      | <b>Dosage:</b>                            | See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from Radio Medical.                                                                     |
|                                                                                     |      | <b>Side-effects:</b>                      | No relevant ones                                                                                                                                               |
|                                                                                     |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Fresenius Kabi)                                                                                                           |
|                                                                                     |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                                                                                                                            |
|                                                                                     |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult <i>Radio Medical</i> .                                                                                                                                 |

Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3  
 Added 16.6 Gelatine Sodium Chlorid replace 16.3

| Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (continued)                                                            |      |                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. valgs præparat ved: Blodtab<br>Shock eller risiko for shock, når årsagen er et akut blodtab<br><br>MFAG, appendix 13                   | 16.6 | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Gelatine, Natriumchlorid                                                                                            |
|                                                                                                                                           |      | <b>Form:</b>                              | Infusionsvæske 40 g succinyleret gelatine og 7 g                                                                    |
|                                                                                                                                           |      | <b>Virkning:</b>                          | Udvider plasmavolumenet svarende til den indgivne                                                                   |
|                                                                                                                                           |      | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination fra Radio Medical.                                                                                 |
|                                                                                                                                           |      | <b>Bivirkninger:</b>                      | Allergiske reaktioner. Overfølsomhedsschock.                                                                        |
|                                                                                                                                           |      | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktionsdato (.Gelefusine, <b>Plast flaske</b> , B.                                                     |
|                                                                                                                                           |      | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur.                                                                                              |
|                                                                                                                                           |      | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical.                                                                                       |
| Second choice of medicament in case of: Loss of blood<br>Shock or risk of shock caused by an acute loss of blood<br><br>MFAG, appendix 13 | 16.6 | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Gelatine, Sodium chloride                                                                                           |
|                                                                                                                                           |      | <b>Form:</b>                              | Infusion liquid.40 g succinyleret gelatine og 7 g Sodium Chloride / litre Containers of 500 ml for intravenous use. |
|                                                                                                                                           |      | <b>Effect:</b>                            | Enlarges the plasma volume equivalent to the amount infused.                                                        |
|                                                                                                                                           |      | <b>Dosage:</b>                            | After ordination from Radio Medical.<br>Because of the risk of allergic shock, the first 10-20 ml                   |
|                                                                                                                                           |      | <b>Side-effects:</b>                      | Allergic reactions. Allergic shock.                                                                                 |
|                                                                                                                                           |      | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Gelofusine, <b>Plastic bottle</b> B. Braun Melsungen AG).                      |
|                                                                                                                                           |      | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature.                                                                                                 |
|                                                                                                                                           |      | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical.                                                                                              |

| Grp. No.                                                                          | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form      | Styrke /<br>Strength | Mængde/<br>Quantity B | MFAG B         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Grp. 1 Ilt / Oxygen</b>                                                        |          |                                                     |                         |                      |                       |                |
| 1.1(π)                                                                            | V03AN01  | Medicinsk ilt                                       | Gas                     | -                    | 0                     | 40 l /200 bar  |
| 1.1(π)                                                                            | V03AN01  | Oxygen, Medical                                     | Gas                     |                      | 0                     | 40 l / 200 bar |
| 1.3(π)                                                                            | V03AN01  | Medicinsk ilt passende til A.1<br>(se note)         | Gas                     | -                    | 2 x2 l/ 200<br>bar    | 0              |
| 1.3(π)                                                                            | V03AN01  | Oxygen Medical suiteable to A.1<br>(see note)       | Gas                     | -                    | 2 x 2 l/ 200<br>bar   | 0              |
| <b>1.3 Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1</b> |          |                                                     |                         |                      |                       |                |
| <b>Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetic</b>                                  |          |                                                     |                         |                      |                       |                |
| 2.1(π)                                                                            | N01BB02  | Lidocain                                            | Inj. Væske              | 10 mg/ ml            | 5 x 10 ml             | 0              |
| 2.1(π)                                                                            | N01BB02  | Lidocaine                                           | Inj. Liquid             | 10 mg/ ml            | 5 x 10 ml             | 0              |
| 2.2                                                                               | D04AB01  | Lidocain                                            | Gel                     | 2 %                  | 30 g                  | 0              |
| 2.2                                                                               | D04AB01  | Lidocaine                                           | Gel                     | 2 %                  | 30 g                  | 0              |
| <b>Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics</b>                                 |          |                                                     |                         |                      |                       |                |
| 3.1                                                                               | N02BE01  | Paracetamol                                         | Tablet                  | 500 mg               | 100 stk.              | 0              |
| 3.1                                                                               | N02BE01  | Paracetamol                                         | Tablets                 | 500 mg               | 100 pcs.              | 0              |
| 3.2(π)                                                                            | M01AE01  | Ibuprofen                                           | Tablet                  | 400 mg               | 30 stk.               | 0              |
| 3.2(π)                                                                            | M01AE01  | Ibuprofen                                           | Tablets                 | 400 mg               | 30 pcs.               | 0              |
| 3.4(π)                                                                            | N02AA01  | Morfin Δ                                            | Inj. Væske              | 10 mg / ml           | 10 x 1 ml             | 0              |
| 3.4(π)                                                                            | N02AA01  | Morphine Δ                                          | Inj. Liquid             | 10 mg / ml           | 10 x 1 ml             | 0              |
| 3.5(π)                                                                            | N02AX02  | Tramadol Δ                                          | Tablet / Kapsel         | 50 mg                | 50 stk.               | 0              |
| 3.5(π)                                                                            | N02AX02  | Tramadole Δ                                         | Tablets / Capsula       | 50 mg                | 50 pcs.               | 0              |
| <b>Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness</b>           |          |                                                     |                         |                      |                       |                |
| 4.1(π)                                                                            | C01CA24  | Adrenalin "K"                                       | Inj. Væske              | 1 mg / ml            | 5 x 1ml               | 0              |
| 4.1(π)                                                                            | C01CA24  | Epinephrine "R"                                     | Inj. Liquid             | 1 mg / ml            | 5 x 1ml               | 0              |
| 4.2(π)                                                                            | R06AX18  | Acrivastin                                          | Kapsel                  | 8 mg                 | 12 pcs.               | 0              |
| 4.2(π)                                                                            | R06AX18  | Acrivastine                                         | Capsula                 | 8 mg                 | 12 pcs.               | 0              |
| 4.3(π)                                                                            | H02AB09  | Hydrocortison                                       | Inj. pulver +<br>væske  | 100 mg               | 1 hætteglas           | 0              |
| 4.3(π)                                                                            | H02AB09  | Hydrocortisonsuccinate                              | Inj. Subst +<br>solvens | 100 mg               | 1 vials               | 0              |
| 4.5                                                                               | N07CA02  | Cinnarizin Δ                                        | Tablet                  | 25 mg                | 50 stk.               | 0              |
| 4.5                                                                               | N07CA02  | Cinnarizine Δ                                       | Tablets                 | 25 mg                | 50 pcs.               | 0              |

7.1 Phenoxymethylpenicillin styrken er ændret til 660 mg - 800 mg

7.1 Phenoxymethylpenicillin strenght change to 660 mg - 800 mg

| Grp. No.                                                                                                                                                        | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form   | Styrke /<br>Strength | Mængde/<br>Quantity B | MFAG B     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Grp. 5 Antidoter / Antidotes</b>                                                                                                                             |          |                                                     |                      |                      |                       |            |
| 5.1(π)                                                                                                                                                          | V03AB15  | Naloxon                                             | Inj. Væske           | 0,4 mg /ml           | 5 x 1 ml              | 0          |
| 5.1(π)                                                                                                                                                          | V03AB15  | Naloxon                                             | Inj. Liquid          | 0,4 mg /ml           | 5 x 1 ml              | 0          |
| 5.2(π)                                                                                                                                                          | H04AA01  | Glucagon "K" (se note)                              | Inj. pulver + væske  | 1 mg                 | 0                     | 0          |
| 5.2(π)                                                                                                                                                          | H04AA01  | Glucagon "R" (see note)                             | Inj. Subst + solvens | 1 mg                 | 0                     | 0          |
| 5.3(π)                                                                                                                                                          | A03BA01  | Atropin                                             | Inj. Væske           | 1mg/ml               | 0                     | 15 x 1ml   |
| 5.3(π)                                                                                                                                                          | A03BA01  | Atropine                                            | Inj. Liquid          | 1mg/ml               | 0                     | 15 x 1ml   |
| 5.4(π)                                                                                                                                                          | D11AX03  | Calcium gluconate                                   | Gel                  | 2%                   | 0                     | 5 x 25 g   |
| 5.4(π)                                                                                                                                                          | D11AX03  | Calcium gluconate                                   | Gel                  | 2%                   | 0                     | 5 x 25 g   |
| 5.5(π)                                                                                                                                                          | A12AA06  | Calcium lactogluconate                              | Brusetablet          | 500 mg               | 0                     | 40 stk     |
| 5.5(π)                                                                                                                                                          | A12AA06  | Calcium lactogluconate                              | Effervescent tablet  | 500 mg               | 0                     | 40 pcs.    |
| 5,6                                                                                                                                                             | A07BA01  | Aktivt kul                                          | Pulver               | 50 g                 | 0                     | 2 x 50 g   |
| 5,6                                                                                                                                                             | A07BA01  | Charcoal, activated                                 | Powder               | 50 g                 | 0                     | 2 x 50 g   |
| 5.7                                                                                                                                                             | -        | Ethyl alcohol                                       | Væske                | 99.9%                | 0                     | 1 x 500 ml |
| 5.7                                                                                                                                                             | -        | Ethyl alcohol                                       | Liquid               | 99.9%                | 0                     | 1 x 500 ml |
| <b>5.2: 1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge / 1 sets to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.</b> |          |                                                     |                      |                      |                       |            |
| <b>Grp. 6 Akut sindsyge og kramper / Mental disorder and convulsion</b>                                                                                         |          |                                                     |                      |                      |                       |            |
| 6.2(π)                                                                                                                                                          | N05BA01  | Diazepam Δ                                          | Tablet               | 5 mg                 | 25 stk.               | 0          |
| 6.2(π)                                                                                                                                                          | N05BA01  | Diazepam Δ                                          | Tablets              | 5 mg                 | 25 pcs.               | 0          |
| 6.3(π)                                                                                                                                                          | N05BA01  | Diazepam Δ                                          | Klysma               | 4 mg / ml            | 5 x 2½ ml             | 0          |
| 6.3(π)                                                                                                                                                          | N05BA01  | Diazepam Δ                                          | Enema                | 4 mg / ml            | 5 x 2½ ml             | 0          |
| 6.4(π)                                                                                                                                                          | N05AD01  | Haloperidol Δ                                       | Inj. Væske           | 5 mg / ml            | 5 x 1 ml              | 0          |
| 6.4(π)                                                                                                                                                          | N05AD01  | Haloperidole Δ                                      | Inj. Liquid          | 5 mg / ml            | 5 x 1 ml              | 0          |
| 6.5(π)                                                                                                                                                          | N05CF02  | Zolpidem Δ                                          | Tablet               | 10 mg                | 10 stk.               | 0          |
| 6.5(π)                                                                                                                                                          | N05CF02  | Zolpidem Δ                                          | Tablets              | 10 mg                | 10 pcs.               | 0          |
| <b>Grp. 7 Infektioner / Infections</b>                                                                                                                          |          |                                                     |                      |                      |                       |            |
| 7.1(π)                                                                                                                                                          | J01CE02  | Phenoxymethylpenicillin                             | Tablet               | 660 - 800 mg         | 100 stk.              | 0          |
| 7.1(π)                                                                                                                                                          | J01CE02  | Phenoxymethylpenicillin                             | Tablets              | 660 - 800 mg         | 100 pcs.              | 0          |
| 7.4(π)                                                                                                                                                          | J01FA01  | Erythromycin                                        | Tablet               | 500 mg               | 30 stk.               | 0          |
| 7.4(π)                                                                                                                                                          | J01FA01  | Erythromycin                                        | Tablets              | 500 mg               | 30 pcs.               | 0          |
| 7.7(π)                                                                                                                                                          | P01AB01  | Metronidazol                                        | Supp.                | 500 mg               | 20 stk.               | 0          |
| 7.7(π)                                                                                                                                                          | P01AB01  | Metronidazole                                       | Supp.                | 500 mg               | 20 pcs.               | 0          |
| 7.8(π)                                                                                                                                                          | J01MA02  | Ciprofloxacin                                       | Tablet               | 250 mg               | 20 stk.               | 0          |
| 7.8(π)                                                                                                                                                          | J01MA02  | Ciprofloxacin                                       | Tablets              | 250 mg               | 20 pcs.               | 0          |
| 7.10(π)                                                                                                                                                         | J07AM01  | Tetanus vaccine "K"                                 | Inj. Væske           | 40 IU.               | 1 x 1 ml              | 0          |
| 7.10(π)                                                                                                                                                         | J07AM01  | Tetanus vaccine "R"                                 | Inj. Liquid          | 40 IU.               | 1 x 1 ml              | 0          |
| 7.11(π)                                                                                                                                                         | J06BB02  | Tetanus immunglobulin "K"                           | Inj. Væske           | 250 IU.              | 1 x 1 ml              | 0          |
| 7.11(π)                                                                                                                                                         | J06BB02  | Tetanus immunglobulin "R"                           | Inj. Liquid          | 250 IU.              | 1 x 1 ml              | 0          |
| 7.12(π)                                                                                                                                                         | J01CF05  | Flucloxacillin                                      | Tablet               | 500 mg               | 50 stk.               | 0          |
| 7.12(π)                                                                                                                                                         | J01CF05  | Flucloxacillin                                      | Tablets              | 500 mg               | 50 pcs.               | 0          |
| 7.13(π)                                                                                                                                                         | J01EE01  | Sulfamethoxazol + trimetoprim                       | Tablet               | 400 / 80 mg          | 24 stk.               | 0          |
| 7.13(π)                                                                                                                                                         | J01EE01  | Sulfamethoxazol + trimetoprim                       | Tablets              | 400 / 80 mg          | 24 pcs.               | 0          |

| Grp. No.                                                                                                                                                                                                      | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient                   | Adm. Form/<br>Form             | Styrke /<br>Strength            | Mængde/<br>Quantity B  | MFAG B     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Grp. 9 Hjerte / Cardiac</b>                                                                                                                                                                                |          |                                                                       |                                |                                 |                        |            |
| 9.1                                                                                                                                                                                                           | C01DA02  | Glycerylnitrate                                                       | Mund pray                      | 0,4 mg/dose                     | 1x200 doser            | 0          |
| 9.1                                                                                                                                                                                                           | C01DA02  | Glyceryl trinitrate                                                   | Oral spray                     | 0,4 mg/dose                     | 1x200 doses            | 0          |
| 9.3                                                                                                                                                                                                           | B01AC06  | Acetylsalisylsyre                                                     | Tablet                         | 150 mg                          | 100 stk.               | 0          |
| 9.3                                                                                                                                                                                                           | B01AC06  | Acetylsalicylic Acid                                                  | Tablet                         | 150 mg                          | 100 pcs.               | 0          |
| 9.4(π)                                                                                                                                                                                                        | C03CA01  | Furosemid                                                             | Tablet                         | 40 mg                           | 50 stk.                | 0          |
| 9.4(π)                                                                                                                                                                                                        | C03CA01  | Furosemide                                                            | Tablet                         | 40 mg                           | 50 pcs.                | 0          |
| <b>Grp. 10 Hud / Skin</b>                                                                                                                                                                                     |          |                                                                       |                                |                                 |                        |            |
| 10.4                                                                                                                                                                                                          | D06BA01  | Sølvulfadiazin                                                        | Crema                          | 1%                              | 50 g                   | 0          |
| 10.4                                                                                                                                                                                                          | D06BA01  | Silver sulfadiazine                                                   | Lotion/Cream                   | 1%                              | 50 g                   | 0          |
| 10.6                                                                                                                                                                                                          | P03AC04  | Permethrin                                                            | Shampoo                        | 1%                              | 50 ml                  | 0          |
| 10.6                                                                                                                                                                                                          | P03AC04  | Permethrin                                                            | Shampoo                        | 1%                              | 50 ml                  | 0          |
| 10.7                                                                                                                                                                                                          | D07AB02  | Glukocorticoid gruppe II                                              | Crema                          | Gruppe II                       | 30 g                   | 0          |
| 10.7                                                                                                                                                                                                          | D07AB02  | Glukocorticoid group II                                               | Lotion/Cream                   | Group II                        | 30 g                   | 0          |
| <b>Grp. 11 Desinficering / Desinfectants</b>                                                                                                                                                                  |          |                                                                       |                                |                                 |                        |            |
| 11.1                                                                                                                                                                                                          | -        | Klorhexidine/ethanol (se note)                                        | Væske                          | 0.5/85%                         | 175 ml                 | 0          |
| 11.1                                                                                                                                                                                                          | -        | Chlorhexidine/ethanol (see note)                                      | Liquid                         | 0.5/85%                         | 175 ml                 | 0          |
| 11.2                                                                                                                                                                                                          | -        | Klorhexidine                                                          | Væske                          | 0.2 %                           | 4 x 250 ml             | 0          |
| 11.2                                                                                                                                                                                                          | -        | Chlorhexidine                                                         | Liquid                         | 0.2 %                           | 4 x 250 ml             | 0          |
| <b>11.1:</b> Alternativt kan anvendes Klorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker<br>Alternatively, Chlorhexidine 0,5 % and ethanol with a minimum of 70 % in 2 separate bottles. Mix 1:1 |          |                                                                       |                                |                                 |                        |            |
| <b>Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal</b>                                                                                                                                                                |          |                                                                       |                                |                                 |                        |            |
| 12.5                                                                                                                                                                                                          | A06AD11  | Lactulose                                                             | Mixtur                         | 667 mg/ml                       | 100 ml                 | 0          |
| 12.5                                                                                                                                                                                                          | A06AD11  | Lactulose                                                             | Mixture                        | 667 mg/ml                       | 100 ml                 | 0          |
| 12.6                                                                                                                                                                                                          | A07DA03  | Loperamid                                                             | Tablet                         | 2 mg                            | 10 stk.                | 0          |
| 12.6                                                                                                                                                                                                          | A07DA03  | Loperamide                                                            | Tablets                        | 2 mg                            | 10 pcs.                | 0          |
| 12.7                                                                                                                                                                                                          | -        | Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat<br>/natriumcitrat/natriumklorid. | Powder                         | 30/1,1/0,11/<br>2,1 g/pulver    | 0                      | 6 x 20,5 g |
| 12.7                                                                                                                                                                                                          | -        | Glucose/potassium/magnesium/<br>sodium                                | Powder                         | 30/1,1/0,11/<br>2,1<br>g/powder | 0                      | 6 x 20,5 g |
| 12.8(π)                                                                                                                                                                                                       | A02BC01  | Omeprazol                                                             | Tablet/Kapsel                  | 20 mg                           | 28 stk..               | 0          |
| 12.8(π)                                                                                                                                                                                                       | A02BC01  | Omeprazole                                                            | Tablets/Capsula                | 20 mg                           | 28 pcs.                | 0          |
| 12.9                                                                                                                                                                                                          | A02A     | Antacida                                                              | Tablet eller oral<br>opløsning | -                               | 20 stk.eller<br>250 ml | 0          |
| 12.9                                                                                                                                                                                                          | A02A     | Antacid                                                               | Tablet or oral<br>solution     | -                               | 20 pcs. or<br>250 ml   | 0          |
| 12.10                                                                                                                                                                                                         | C05A     | Hæmoride creme (skal indeholde<br>glukokortikoid and smertestillende) | Crema/Salve                    | -                               | 30 g                   | 0          |
| 12.10                                                                                                                                                                                                         | C05A     | Anti haemorrhoid agent (Must contain<br>glucocorticoid and analgesi)  | Lotion/Ointment                | -                               | 30 g                   | 0          |
| 12.12(π)                                                                                                                                                                                                      | A03FA03  | Domperidon (se note)                                                  | Tablet                         | 10 mg                           | 30 pcs.                | 0          |
| 12.12(π)                                                                                                                                                                                                      | A03FA03  | Domperidone (see note)                                                | Tablets                        | 10 mg                           | 30 pcs.                | 0          |
| <b>12.12</b> Erstatte, den i MFAG nævnte, supp. Metoclopramid / Replaceses the supp. Metoclopramide described in MFAG.                                                                                        |          |                                                                       |                                |                                 |                        |            |

| Grp. No.                                                                                           | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient | Adm. Form/<br>Form | Styrke /<br>Strength | Mængde/<br>Quantity B | MFAG B        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears</b>                                                         |          |                                                     |                    |                      |                       |               |
| 13.2(π)                                                                                            | S01HA06  | Cinchocain                                          | Salve              | 0,50%                | 2 x 1g                | 3 x 1 g       |
| 13.2(π)                                                                                            | S01HA06  | Cinchocaine                                         | Ointment           | 0,50%                | 2 x 1g                | 3 x 1 g       |
| 13.4(π)                                                                                            | S01EB51  | Pilocarpin                                          | Dråber             | 2%                   | 10 ml                 | 0             |
| 13.4(π)                                                                                            | S01EB51  | Pilocarpine                                         | Drops              | 2%                   | 10 ml                 | 0             |
| 13.8(π)                                                                                            | S01AA13  | Fusidin                                             | Dråber / gel       | 1%                   | 2 x 5g                | 0             |
| 13.8(π)                                                                                            | S01AA13  | Fusidin                                             | Eye drops / gel    | 1%                   | 2 x 5g                | 0             |
| 13.10(π)                                                                                           | D07CA01  | Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.  | Dråber             | 15+5+1 mg/ml         | 5 ml                  | 0             |
| 13.10(π)                                                                                           | D07CA01  | Hydrocortison with Terramycin® and Polymyxin-B Comb | Drops              | 15+5+1 mg/ml         | 5 ml                  | 0             |
| <b>Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology</b>                                                             |          |                                                     |                    |                      |                       |               |
| 14.2(π)                                                                                            | G02AB01  | Methyleergometrin                                   | Tablet             | 0,125 mg             | 10 pcs.               | 0             |
| 14.2(π)                                                                                            | G02AB01  | Methyleergometrine                                  | Tablets            | 0,125 mg             | 10 pcs.               | 0             |
| 14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord./ shall only be available IF women on board. |          |                                                     |                    |                      |                       |               |
| <b>Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold</b>                                         |          |                                                     |                    |                      |                       |               |
| 15.1                                                                                               | R05DA09  | Dextromethorphan                                    | Tablet             | 30 mg                | 20 stk.               | 0             |
| 15.1                                                                                               | R05DA09  | Dextromethorphan                                    | Tablets            | 30 mg                | 20 pcs.               | 0             |
| 15.2(π)                                                                                            | R03AC03  | Terbutalin                                          | Turbohaler         | 0,5 mg/dose          | 100 doser             | 100 doser     |
| 15.2(π)                                                                                            | R03AC03  | Terbutaline                                         | Turbohaler         | 0,5 mg/dose          | 100 doses             | 100 doses     |
| 15.4(π)                                                                                            | R03BA02  | Budesonid                                           | Turbohaler         | 0,2 mg/dose          | 0                     | 5 x 100 doser |
| 15.4(π)                                                                                            | R03BA02  | Budesonide                                          | Turbohaler         | 0,2 mg/dose          | 0                     | 5 x 100 doses |
| 15.5(π)                                                                                            | R01AA07  | Xylometazolin                                       | Dråber / spray     | 1 mg / ml            | 10 ml                 | 0             |
| 15.5(π)                                                                                            | R01AA07  | Xylometazoline                                      | Drops / spray      | 1 mg / ml            | 10 ml                 | 0             |
| <b>Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)</b>     |          |                                                     |                    |                      |                       |               |
| 16.1(π)                                                                                            | B05BB01  | Natriumklorid                                       | Inf. Væske         | 0.9 %                | 0                     | 3 x 1 liter   |
| 16.1(π)                                                                                            | B05BB01  | Sodium chloride                                     | Inf. Liquid        | 0.9 %                | 0                     | 3 x 1 litre   |
| 16.2(π)                                                                                            | B05BB02  | Glucose + Natriumklorid                             | Inf. Væske         | 25/4,5 mg/ml         | 3 x 1 liter           | 0             |
| 16.2(π)                                                                                            | B05BB02  | Glucose + sodium chloride                           | Inf. Liquid        | 25/4,5 mg/ml         | 3 x 1 litre           | 0             |
| 16.3(π)                                                                                            | B05AA07  | Hydroxyethylstivelse                                | Inf. Væske         | 60 mg/ml             | 500 ml                | 2 x 500 ml    |
| 16.3(π)                                                                                            | B05AA07  | Hydroxyethylamyloid                                 | Inf. Liquid        | 60 mg/ml             | 500 ml                | 2 x 500 ml    |
| 16.5(π)                                                                                            | V07AB    | Natriumklorid 20 ml                                 | Væske              | 0.9 %                | 20 x 20 ml            | 0             |
| 16.5(π)                                                                                            | V07AB    | Sodium chloride 20 ml                               | Liquid             | 0.9 %                | 20 x 20 ml            | 0             |
| Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder / Infusion liquids may not be in glass container     |          |                                                     |                    |                      |                       |               |

| Grp. No.                                                                         | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                                    | Mængde/ Quentety B | MFAG B |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment</b>                          |                                                                                         |                    |        |
| A.1                                                                              | Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort (se note)                                         | 1 sæt              | 0      |
| A.1                                                                              | Mobile resuscitation equipment (see note)                                               | 1 set              | 0      |
| A.4                                                                              | Tungeholdere, størrelse 2                                                               | 0                  | 2 stk. |
| A.4                                                                              | Guidel airway, size 2                                                                   | 0                  | 2 pcs. |
| A.5                                                                              | Tungeholdere, størrelse 3                                                               | 1 stk.             | 1 stk. |
| A.5                                                                              | Guidel airway, size 3                                                                   | 1 pcs.             | 1 pc.  |
| A.6                                                                              | Tungeholdere, størrelse 4                                                               | 0                  | 2 stk. |
| A.6                                                                              | Guidel airway, size 4                                                                   | 0                  | 2 pcs. |
| A.7                                                                              | Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske                                       | 0                  | 1 stk. |
| A.7                                                                              | Extra ventilation bag with valve and mask                                               | 0                  | 1 pc.  |
| A.8                                                                              | Kraftig klædesaks                                                                       | 1 stk.             | 0      |
| A.8                                                                              | Strong scissors for clothes                                                             | 1 pcs.             | 0      |
| A.9                                                                              | Sugekatetre, lige, CH 12                                                                | 2 stk.             | 0      |
| A.9                                                                              | Suction catheters, straight, CH 12                                                      | 2 pcs.             | 0      |
| A.10                                                                             | Tæppe til behandling af hypotermi                                                       | 1 stk.             | 0      |
| A.10                                                                             | Blanket for treatment of hypothermia                                                    | 1 pcs.             | 0      |
| A.13                                                                             | Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange                                     | 1 stk.             | 9 stk. |
| A.13                                                                             | Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube                                  | 1 pcs.             | 9 pcs. |
| A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1 |                                                                                         |                    |        |
| <b>B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape</b>                  |                                                                                         |                    |        |
| B.2                                                                              | Sterile gazeekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag                                      | 10 stk.            | 0      |
| B.2                                                                              | Sterile gaze compress, approx. 10 x 10 cm, approx. 8 layers                             | 10 pcs.            | 0      |
| B.4                                                                              | Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm                                                   | 3 stk.             | 0      |
| B.4                                                                              | Sterile compress bandages, approx. 8 cm                                                 | 3 pcs.             | 0      |
| B.5                                                                              | Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet                                               | 1 x 10 stk.        | 0      |
| B.5                                                                              | Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet                                           | 1 x 10 pcs.        | 0      |
| B.6                                                                              | Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm                        | 1 stk.             | 0      |
| B.6                                                                              | Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressing bandages, approx. 10 x 10 cm | 1 pcs.             | 0      |
| B.7                                                                              | Gazeviskers, usterile                                                                   | 100 stk.           | 0      |
| B.7                                                                              | Gauze swaps, non-sterile                                                                | 100 pcs.           | 0      |
| B.8                                                                              | Tubegaze til fingerforbindinger                                                         | 2 stk.             | 0      |
| B.8                                                                              | Tube shaped gauze for finger bandaging                                                  | 2 pcs.             | 0      |
| B.9                                                                              | Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m                                                        | 5 ruller           | 0      |
| B.9                                                                              | Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m                                                | 5 rolls            | 0      |
| B.10                                                                             | Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning                          | 1 pakke            | 0      |
| B.10                                                                             | Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack                                 | 1 pack             | 0      |
| B.11                                                                             | Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m                                                 | 2 pakker           | 0      |
| B.11                                                                             | Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m                                          | 2 packs            | 0      |
| B.12                                                                             | Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m                                            | 1 rulle            | 0      |
| B.12                                                                             | Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m                                            | 1 roll             | 0      |
| B.13                                                                             | Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm                                                 | 1 ruller           | 0      |
| B.13                                                                             | Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm                                              | 1 rolls            | 0      |

Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning  
Added B.14 Torniquet to artieriel bleeding

| B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape |                                                                                        |             |   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| B.2                                                      | Sterile gazekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag                                      | 10 stk.     | 0 |
| B.2                                                      | Sterile gaze compress, approx. 10 x 10 cm, approx. 8 layers                            | 10 pcs.     | 0 |
| B.4                                                      | Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm                                                  | 3 stk.      | 0 |
| B.4                                                      | Sterile compress bandages, approx. 8 cm                                                | 3 pcs.      | 0 |
| B.5                                                      | Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet                                              | 1 x 10 stk. | 0 |
| B.5                                                      | Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet                                          | 1 x 10 pcs. | 0 |
| B.6                                                      | Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm                       | 1 stk.      | 0 |
| B.6                                                      | Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressingbandages, approx. 10 x 10 cm | 1 pcs.      | 0 |
| B.7                                                      | Gazeviskers, usterile                                                                  | 100 stk.    | 0 |
| B.7                                                      | Gauze swaps, non-sterile                                                               | 100 pcs.    | 0 |
| B.8                                                      | Tubegaze til fingerforbindinger                                                        | 2 stk.      | 0 |
| B.8                                                      | Tube shaped gauze for finger bandaging                                                 | 2 pcs.      | 0 |
| B.9                                                      | Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m                                                       | 5 ruller    | 0 |
| B.9                                                      | Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m                                               | 5 rolls     | 0 |
| B.10                                                     | Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning                         | 1 pakke     | 0 |
| B.10                                                     | Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack                                | 1 pack      | 0 |
| B.11                                                     | Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m                                                | 2 pakker    | 0 |
| B.11                                                     | Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m                                         | 2 packs     | 0 |
| B.12                                                     | Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m                                           | 1 rulle     | 0 |
| B.12                                                     | Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m                                           | 1 roll      | 0 |
| B.13                                                     | Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm                                                | 1 ruller    | 0 |
| B.13                                                     | Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm                                             | 1 rolls     | 0 |
| B.14                                                     | Årepresse til pulsåreblødning                                                          | 1 stk.      | 0 |
| B.14                                                     | Torniquet to artieriel bleeding                                                        | 1 pc.       | 0 |

| Grp. No.                                                 | Medicinsk udstyr / Medical equipment                           | Mængde/ Quentety B | MFAG B |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation</b> |                                                                |                    |        |
| C.1                                                      | Engangshandsker af latex, usterile, X-large                    | 20 stk.            | 0      |
| C.1                                                      | Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large                 | 20 pcs.            | 0      |
| C.2                                                      | Engangshandsker af latex, usterile, large                      | 20 stk.            | 0      |
| C.2                                                      | Disposable gloves, latex, non-sterile, large                   | 20 pcs.            | 0      |
| C.5                                                      | Vaskesvampe, éngangs                                           | 25 stk.            | 0      |
| C.5                                                      | Bath sponge, disposable                                        | 25 pcs.            | 0      |
| C.6                                                      | Beskyttelsesbriller                                            | 1 stk.             | 0      |
| C.6                                                      | Protective goggles                                             | 1 pcs.             | 0      |
| C.7                                                      | Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm                               | 2 stk.             | 0      |
| C.7                                                      | Sterile drape, approx. 50 x 50 cm                              | 2 pcs.             | 0      |
| C.8                                                      | Flydende medicinsk sæbe pH 4,5                                 | 250 ml             | 0      |
| C.8                                                      | Liquid medical soap pH 4,5                                     | 250 ml             | 0      |
| <b>D. Sårbehandling / Treatment of wounds</b>            |                                                                |                    |        |
| D.1                                                      | Suturtape, Steri-StripTM                                       | 10 stk             | 0      |
| D.1                                                      | Suturtape, Steri-StripTM                                       | 10 pcs.            | 0      |
| D.4                                                      | Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS                         | 6 stk.             | 0      |
| D.4                                                      | Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS                          | 6 pcs.             | 0      |
| D.5                                                      | Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm                        | 1 stk.             | 0      |
| D.5                                                      | Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x3 cm | 1 pcs.             | 0      |
| D.7                                                      | Kirurgisk saks med lige spids                                  | 1 stk.             | 0      |
| D.7                                                      | Surgical scissors w/straight points                            | 1 pcs.             | 0      |
| D.9                                                      | Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm                               | 1 stk.             | 0      |
| D.9                                                      | Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm                 | 1 pcs.             | 0      |
| D.11                                                     | Splintpincet                                                   | 1 stk.             | 0      |
| D.11                                                     | Forceps, splinter (tweezers)                                   | 1 pc.              | 0      |
| D.12                                                     | Pean, krum                                                     | 1 stk.             | 0      |
| D.12                                                     | Pean, curved                                                   | 1 pcs.             | 0      |
| D.13                                                     | Nåleholder                                                     | 1 stk.             | 0      |
| D.13                                                     | Suture - holder                                                | 1 pcs.             | 0      |
| D.14                                                     | Barbermaskine (skraber), engangs                               | 1 stk.             | 0      |
| D.14                                                     | Safety razor, disposable single use                            | 1 pc.              | 0      |
| D.15                                                     | Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm         | 4 stk.             | 0      |
| D.15                                                     | Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm    | 4 pcs.             | 0      |

Tilføjet C.13 Engangsforklæde  
Added C.13 Disposable apron

Tilføjet C.14 Lagen, sterilt  
Added C.14 Bed sheet, sterile

| Grp. No.                                                 | Medicinsk udstyr / Medical equipment           | Mængde/ Quantity B | MFAG B |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation</b> |                                                |                    |        |
| C.1                                                      | Engangshandsker af latex, usterile, X-large    | 20 stk.            | 0      |
| C.1                                                      | Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large | 20 pcs.            | 0      |
| C.2                                                      | Engangshandsker af latex, usterile, large      | 20 stk.            | 0      |
| C.2                                                      | Disposable gloves, latex, non-sterile, large   | 20 pcs.            | 0      |
| C.5                                                      | Vaskesvampe, éngangs                           | 25 stk.            | 0      |
| C.5                                                      | Bath sponge, disposable                        | 25 pcs.            | 0      |
| C.6                                                      | Beskyttelsesbriller                            | 1 stk.             | 0      |
| C.6                                                      | Protective goggles                             | 1 pcs.             | 0      |
| C.7                                                      | Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm               | 2 stk.             | 0      |
| C.7                                                      | Sterile drape, approx. 50 x 50 cm              | 2 pcs.             | 0      |
| C.8                                                      | Flydende medicinsk sæbe pH 4,5                 | 250 ml             | 0      |
| C.8                                                      | Liquid medical soap pH 4,5                     | 250 ml             | 0      |
| C.13                                                     | Engangsforklæde                                | 5 stk.             | 0      |
| C.13                                                     | Disposable apron                               | 5 stk.             | 0      |
| C.14                                                     | Lagen, sterilt                                 | 1 stk.             | 0      |
| C.14                                                     | Bed sheet, sterile                             | 1 pc.              | 0      |

| Grp. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                        | Mængde/ Quantity B | MFAG B  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                    |         |
| E.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanylebøtte                                                                 | 1 stk.             | 0       |
| E.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Box for contaminated needles                                                | 1 pcs.             | 0       |
| E.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70%                                  | 50 stk.            | 0       |
| E.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%                                        | 50 pcs.            | 0       |
| E.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staserem                                                                    | 1 stk.             | 0       |
| E.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Torniquet                                                                   | 1 pcs.             | 0       |
| E.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optiva*2 , intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g (se note)                      | 5 stk.             | 5 stk.  |
| E.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optiva*2 , intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g (see note)                    | 5 pcs.             | 5 pcs.  |
| E.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vecafix®, fikseringsplaster til intravenøs kanyle                           | 5 stk.             | 5 stk.  |
| E.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vecafix®, fixing plaster for intravenous needle                             | 5 pcs.             | 5 pcs.  |
| E.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) (se note)          | 10 stk.            | 40 stk. |
| E.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Needle, sterile, disposable single use, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) (see note) | 10 pcs.            | 40 pcs. |
| E.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml                               | 5 stk.             | 45 stk. |
| E.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml                                   | 5 pcs.             | 45 pcs. |
| E.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml                               | 5 stk.             | 5 stk.  |
| E.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml                                   | 5 pcs.             | 5 stk.  |
| E.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug         | 2 stk.             | 5 stk.  |
| E.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use          | 2 pcs.             | 5 pcs.  |
| <b>E.4+E.6:</b> Kanyle i kaliber 0,8 og intravenøs kanyle kaliber 1,2, som beskrevet i MFAG, er erstattet af kanyle i kaliber 0,6 og intravenøs kanyle kaliber 1,1.<br><b>E.4+E.6:</b> Needles size 0.8 and intravenous cannula size 1.2, as described in MFAG, are replaced with needles size 0.6 and intravenous cannula size 1.1 |                                                                             |                    |         |
| <b>F. Udstyr til medicinsk undersøgelse / Equipment for medical examination</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    |         |
| F.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blodtryksmåler                                                              | 1 stk.             | 0       |
| F.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instrument for measuring blood pressure                                     | 1 pcs.             | 0       |
| F.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stetoskop                                                                   | 1 stk.             | 0       |
| F.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stethoscope                                                                 | 1 pcs.             | 0       |
| F.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Digitalt lægetermometer                                                     | 1 stk.             | 0       |
| F.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Digital clinical thermometer                                                | 1 pcs.             | 0       |
| F.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pencillygte m. batterier                                                    | 1 stk.             | 0       |
| F.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pencil lamp w/batteries                                                     | 1 pcs.             | 0       |
| F.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tungespatel, usterile, engangs                                              | 5 stk.             | 0       |
| F.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tongue depressor, non-sterile, single use disposable                        | 5 pcs.             | 0       |
| F.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pandelampe                                                                  | 1 stk.             | 0       |
| F.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Head lamp                                                                   | 1 pcs.             | 0       |
| <b>H. Øjenundersøgelse og behandling / Eye examination and treatment</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                    |         |
| H.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pencillygte med UV lys, inkl. batterier                                     | 1 stk.             | 0       |
| H.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lamp with UV light w/batteries                                              | 1 pc.              | 0       |
| H.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fluoretsstrips til farvning af øjet                                         | 10 stk.            | 0       |
| H.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fluorescent colour for the eye                                              | 10 pcs.            | 0       |
| H.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vatpinde, sterile                                                           | 20 stk.            | 0       |
| H.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cotton sticks, sterile                                                      | 20 pcs.            | 0       |
| H.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Øjenklap                                                                    | 1 stk.             | 0       |
| H.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eye patch                                                                   | 1 pcs.             | 0       |
| H.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Øjenskyllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml                                | 4 stk.             | 0       |
| H.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eye irrigating liquid, Sodium chloride 0.9%, 250 ml                         | 4 pcs.             | 0       |

Tilføjet F.7 Hypotermi Termometer  
Added F.7 Hypotermi thermometer

| F. Udstyr til medicinsk undersøgelse / Equipment for medical examination |                                                      |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---|
| F.1                                                                      | Blodtryksmåler                                       | 1 stk. | 0 |
| F.1                                                                      | Instrument for measuring blood pressure              | 1 pcs. | 0 |
| F.2                                                                      | Stetoskop                                            | 1 stk. | 0 |
| F.2                                                                      | Stethoscope                                          | 1 pcs. | 0 |
| F.3                                                                      | Digitalt lægetermometer                              | 1 stk. | 0 |
| F.3                                                                      | Digital clinical thermometer                         | 1 pcs. | 0 |
| F.4                                                                      | Pencillygte m. batterier                             | 1 stk. | 0 |
| F.4                                                                      | Pencil lamp w/batteries                              | 1 pcs. | 0 |
| F.5                                                                      | Tungespatel, usterile, engangs                       | 5 stk. | 0 |
| F.5                                                                      | Tongue depressor, non-sterile, single use disposable | 5 pcs. | 0 |
| F.6                                                                      | Pandelampe                                           | 1 stl. | 0 |
| F.6                                                                      | Head lamp                                            | 1 pcs. | 0 |
| F.7                                                                      | Hypotermi Termometer                                 | 1 stk. | 0 |
| F.7                                                                      | Hypotermi thermometer                                | 1 pc.  | 0 |

| Grp. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                | Mængde/ Quantity B | MFAG B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                    |        |
| I.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd                       | 2 stk.             | 0      |
| I.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men               | 2 pcs.             | 0      |
| I.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urinkelbe, plastic                                                  | 1 stk.             | 0      |
| I.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bed bottle, plastic                                                 | 1 pcs.             | 0      |
| <b>J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                    |        |
| J.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm                             | 1 stk.             | 0      |
| J.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ColdHot™ pack 11 x 24 cm                                            | 1 pcs.             | 0      |
| J.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elastikbind, ca. 10 cm x 5m                                         | 1 stk.             | 0      |
| J.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m                                 | 1 pcs.             | 0      |
| J.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elastikbind, ca. 6 cm x 5m                                          | 1 stk.             | 0      |
| J.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m                                  | 1 pcs.             | 0      |
| J.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trekantet tørklæde (Mitella)                                        | 2 stk.             | 0      |
| J.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triangular scarf (Mitella)                                          | 2 pcs.             | 0      |
| J.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sikkerhedsnåle                                                      | 12 stk.            | 0      |
| J.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Safety pins                                                         | 12 pcs.            | 0      |
| J.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fingerskinne til immobilisering af ét led                           | 2 stk.             | 0      |
| J.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finger splint for immobilisation of one joint                       | 2 pcs.             | 0      |
| J.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m                        | 1 rulle            | 0      |
| J.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m                        | 1 roll             | 0      |
| <b>K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                    |        |
| K.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm                           | 1 stk.             | 0      |
| K.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inflatable fracture splint, senior, full arm                        | 1 pcs.             | 0      |
| K.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben                           | 1 stk.             | 0      |
| K.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inflatable fracture splint, senior, full leg                        | 1 pcs.             | 0      |
| K.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner             | 1 stk.             | 0      |
| K.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stiff neck collar, adjustable                                       | 1 pcs.             | 0      |
| <b>M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                    |        |
| M.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medicnålebægre, ca. 25 ml, éngangs                                  | 10 stk.            | 0      |
| M.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable                  | 10 pcs.            | 0      |
| <b>O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                    |        |
| O.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Søfartsstyrelsens Lægebog                                           | 1 stk.             | 0      |
| O.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority | 1 pcs.             | 0      |
| O.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortegnelse, kontrol dokument og brugervejledning kategori B MFAG B | 1 stk.             | 0      |
| O.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inventory, Control document and Userinstruction Category B MFAG B   | 1 pcs.             | 0      |
| O.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Radio Medical Optegnelser                                           | 1 stk.             | 0      |
| O.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Radio Medical Records                                               | 1 pcs.             | 0      |
| O.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MFAG (Medical First Aid Guide)                                      | 0                  | 1 stk. |
| O.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MFAG (Medical First Aid Guide)                                      | 0                  | 1 pc.  |
| <b>O.2</b> Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer. /<br><b>O.2</b> Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on.<br><b>O.3</b> skal være tilgængelig i digital eller printet udgave.<br><b>O.3</b> must be available in digital or printed version. |                                                                     |                    |        |

Note O.2 er fjernet

Note O.2 removed

| O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.                                                  |                                                                                                                        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| O.2                                                                                                               | Søfartsstyrelsens Lægebog eller Lægebog for søfarende                                                                  | 1 stk. | 0      |
| O.2                                                                                                               | The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority or Medical guide for seafarers issued by Seahealth | 1 pcs. | 0      |
| O.3                                                                                                               | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B                                                     | 1 stk  | 0      |
| O.3                                                                                                               | Inventory, Control document and Userinstruction Category B MFAG B                                                      | 1 pcs. | 0      |
| O.5                                                                                                               | Radio Medical Optegnelser                                                                                              | 1 stk. | 0      |
| O.5                                                                                                               | Radio Medical Records                                                                                                  | 1 pcs. | 0      |
| O.6                                                                                                               | MFAG (Medical First Aid Guide)                                                                                         | 0      | 1 stk. |
| O.6                                                                                                               | MFAG (Medical First Aid Guide)                                                                                         | 0      | 1 pc.  |
| O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave.<br>O.3 must be available in digital or printed version. |                                                                                                                        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12.12 Tablet / Tablet<br/> <b>Domperidon</b> 10 mg<br/> Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting<br/> MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / Storage normal temperatur.</p>                                   | <p>15.4 turbuhaler / turbuhaler<br/> <b>Budesonid</b> 0,2 mg/dose<br/> Indikation / Indication: Astma / Asthma; MFAG tabel 9<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                                                                                                                                |
| <p>13.2 øjensalve / eyeointment<br/> <b>Cinchocain</b> 5 mg/g<br/> Indikation / Indication: Lokalbedøvelse af øje / Local anaesthetic of eye;<br/> MFAG tabel Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> | <p>15.5 næsespray / dråber / nose spray / drops<br/> <b>Xylometazolin</b> 1 mg/ml<br/> Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                                                                                                                    |
| <p>13.4 øjendråber / eyedrops<br/> <b>Pilocarpin</b> 20 mg/ml<br/> Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                         | <p>16.1 inf.væske / inf.liquid<br/> <b>Natriumklorid / sodium chloride</b> 9 mg/ml<br/> Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood; MFAG tabel 7<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                                                                                                      |
| <p>13.10 øjendråber / eyedrops<br/> <b>Hydrocortison med/with Terramycin® og Polymyxin-B Comb</b><br/> Indikation / Indication:<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                          | <p>16.2 inf.væske / inf.liquid<br/> <b>Glucose og natrium / glucose and sodium</b> 25/4,5 mg/ml<br/> Indikation / Indication: Væsketab / Rehydration<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                                                                                                        |
| <p>13.8 øjendråber / eyedrops<br/> <b>Fusidinsyre</b> 10mg/g i/in 5g tube<br/> Indikation: Øjeninflammation / Inflammation of eye<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory.<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur</p>                                                | <p>16.3 inf.væske / inf.liquid<br/> <b>Hydroxyethylstivelse/hydroxyethyl amyloid</b> 60 mg/ml<br/> Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood / MFAG app. 13<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                                                                                          |
| <p>14.2 tablet / tablet<br/> <b>Methylergometrin</b> 0,125 mg<br/> Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>          | <p>16.5 Inj. væske / inj.liquid<br/> <b>Natriumklorid / sodium chloride</b> 9 mg/ml<br/> Indikation / Indication: Væske til gennemsyning af intravenøs kanyle, sårbehandling, øjenbehandling / Fluid for flushing intravenous needle, treatment of wound, treatment of eyes<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p> |
| <p>15.1 Tablet / Tablet<br/> <b>Dextromethorphan</b> 30 mg<br/> Indikation / Indication: Hoste / Cough<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>15.2 turbuhaler / turbuhaler<br/> <b>Terbutalin</b> 0,5 mg/dose<br/> Indikation / Indication: Astma / Asthma<br/> MFAG tabel 9<br/> Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory<br/> Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical<br/> Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Grp. No.  | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutical Ingredient                          | Adm. Form/<br>Form          | Mængde /<br>Amount |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 12.5      | A06AD11  | Lactulose                                                                    | Mixtur                      |                    |
| 12.5      | A06AD11  | Lactulose                                                                    | Mixture                     |                    |
| 12.6 (π)  | A07DA03  | Loperamid                                                                    | Tablet                      |                    |
| 12.6 (π)  | A07DA03  | Loperamide                                                                   | Tablets                     |                    |
| 12.7      | -        | Glucose/potassium/magnesium/<br>sodium                                       | Pulver                      |                    |
| 12.7      | -        | Glucose/potassium/magnesium/sodium                                           | Powder                      |                    |
| 12.8 (π)  | A02BC01  | Omeprazol                                                                    | Tablet / Kapsel             |                    |
| 12.8 (π)  | A02BC01  | Omeprazole                                                                   | Tablets / Capsula           |                    |
| 12.9      | A02A     | Antacida                                                                     | Tablet or oral<br>pøsning   |                    |
| 12.9      | A02A     | Antacid                                                                      | Tablets or oral<br>solution |                    |
| 12.10     | C05A     | Hæmoride creme (skal indeholde<br>glukokortikoid og smertestillende middel)  | Creme/Salve                 |                    |
| 12.10     | C05A     | <i>Anti haemorrhoid agent (Must contain<br/>glucocorticoid and analgesi)</i> | Lotion/ointment             |                    |
| 12.12 (π) | A03FA03  | Domperidon                                                                   | Tablet                      |                    |
| 12.12 (π) | A03FA03  | Domperidone                                                                  | Tablets                     |                    |
| 13.2 (π)  | S01HA06  | Cinchocain                                                                   | Salve                       |                    |
| 13.2 (π)  | S01HA06  | Cinchocaine                                                                  | Oinment                     |                    |
| 13.4 (π)  | S01EB51  | Pilocarpin                                                                   | Dråber                      |                    |
| 13.4 (π)  | S01EB51  | Pilocarpine                                                                  | Drops                       |                    |
| 13.10 (π) | S03CA04  | Hydrocortison med Terramycin® og<br>Polymyxin-B komb                         | Dråber                      |                    |
| 13.10 (π) | S03CA04  | Hydrocortison med Terramycin® og<br>Polymyxin-B comb                         | Drops                       |                    |
| 13.8 (π)  | S01AA13  | Fusidin                                                                      | Dråber / gel                |                    |
| 13.8 (π)  | S01AA13  | Fusidin                                                                      | Eye drops / gel             |                    |
| 14.2 (π)  | G02AB01  | Methylegometrin                                                              | Tablet                      |                    |
| 14.2 (π)  | G02AB01  | Methylegometrine                                                             | Tablets                     |                    |
| 15.1      | R05DA09  | Dextromethorphan                                                             | Tablet                      |                    |
| 15.1      | R05DA09  | Dextromethorphan                                                             | Tablets                     |                    |
| 15.2 (π)  | R03AC03  | Terbutalin                                                                   | Turbohaler                  |                    |
| 15.2 (π)  | R03AC03  | Terbutaline                                                                  | Turbohaler                  |                    |
| 15.4 (π)  | R03BA02  | Budesonid                                                                    | Turbohaler                  |                    |
| 15.4 (π)  | R03BA02  | Budesonide                                                                   | Turbohaler                  |                    |
| 15.5      | R01AA07  | Xylometazolin                                                                | Dråber / spray              |                    |
| 15.5      | R01AA07  | Xylometazoline                                                               | Drops / spray               |                    |
| 16.1 (π)  | B05BB01  | Natriumklorid                                                                | Inf. Væske                  |                    |
| 16.1 (π)  | B05BB01  | Sodium chloride                                                              | Inf. Liquid                 |                    |
| 16.2 (π)  | B05BB02  | Glucose + Natriumklorid                                                      | Inf. Væske                  |                    |
| 16.2 (π)  | B05BB02  | Glucose + sodiumchlorid                                                      | Inf. Liquid                 |                    |
| 16.3 (π)  | B05AA07  | Hydroxyethylstivelse                                                         | Inf. Væske                  |                    |
| 16.3 (π)  | B05AA07  | Hydroxyethylamyloid                                                          | Inf. Liquid                 |                    |
| 16.5      | V07AB    | Natriumklorid 20 ml                                                          | Væske                       |                    |
| 16.5      | V07AB    | Sodium chloride 20 ml                                                        | Liquid                      |                    |

O.2 Tilføjet nye lægebog fra Seahealth  
O.2 Add. new medical guide from Seahealth

| O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| O.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Søfartsstyrelsens Lægebog eller Lægebog for søfarende                                                                  | 1 stk. | 0      |
| O.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority or Medical guide for seafarers issued by Seahealth | 1 pcs. | 0      |
| O.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B                                                     | 1 stk  | 0      |
| O.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inventory, Control document and Userinstruction Category B MFAG B                                                      | 1 pcs. | 0      |
| O.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Radio Medical Optegnelser                                                                                              | 1 stk. | 0      |
| O.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Radio Medical Records                                                                                                  | 1 pcs. | 0      |
| O.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MFAG (Medical First Aid Guide)                                                                                         | 0      | 1 stk. |
| O.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MFAG (Medical First Aid Guide)                                                                                         | 0      | 1 pc.  |
| <p><b>O.2</b> Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer. /</p> <p><b>O.2</b> Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on.</p> <p><b>O.3</b> skal være tilgængelig i digital eller printet udgave.</p> <p><b>O.3</b> must be available in digital or printed version.</p> |                                                                                                                        |        |        |

Note ved O.2 fjernet  
Note to O.2 is removed

| Grp. No                                                                                                                                                                                                                             | Medicinsk udstyr / Medical equipment                                                                           | Mængde/ Quentety |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| J.1                                                                                                                                                                                                                                 | ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm                                                                        |                  |
| J.1                                                                                                                                                                                                                                 | ColdHot™ pack 11 x 24 cm                                                                                       |                  |
| J.2                                                                                                                                                                                                                                 | Elastikbind, ca. 10 cm x 5m                                                                                    |                  |
| J.2                                                                                                                                                                                                                                 | Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m                                                                            |                  |
| J.3                                                                                                                                                                                                                                 | Elastikbind, ca. 6 cm x 5m                                                                                     |                  |
| J.3                                                                                                                                                                                                                                 | Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m                                                                             |                  |
| J.4                                                                                                                                                                                                                                 | Trekantet tørklæde (Mitella)                                                                                   |                  |
| J.4                                                                                                                                                                                                                                 | Triangular scarf (Mitella)                                                                                     |                  |
| J.5                                                                                                                                                                                                                                 | Sikkerhedsnåle                                                                                                 |                  |
| J.5                                                                                                                                                                                                                                 | Safety pins                                                                                                    |                  |
| J.6                                                                                                                                                                                                                                 | Fingerskinne til immobilisering af ét led                                                                      |                  |
| J.6                                                                                                                                                                                                                                 | Finger splint for immobilisation of one joint                                                                  |                  |
| J.10                                                                                                                                                                                                                                | Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m                                                                   |                  |
| J.10                                                                                                                                                                                                                                | Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m                                                                   |                  |
| K.2                                                                                                                                                                                                                                 | Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm                                                                      |                  |
| K.2                                                                                                                                                                                                                                 | Inflatable fracture splint, senior, full arm                                                                   |                  |
| K.3                                                                                                                                                                                                                                 | Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben                                                                      |                  |
| K.3                                                                                                                                                                                                                                 | Inflatable fracture splint, senior, full leg                                                                   |                  |
| K.4                                                                                                                                                                                                                                 | Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner                                                        |                  |
| K.4                                                                                                                                                                                                                                 | Stiff neck collar, adjustable                                                                                  |                  |
| M.1                                                                                                                                                                                                                                 | Medicinhålebægre, ca. 25 ml, éngangs                                                                           |                  |
| M.1                                                                                                                                                                                                                                 | Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable                                                             |                  |
| O.1                                                                                                                                                                                                                                 | Søfartsstyrelsens forskrifter om sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe                                  |                  |
| O.1                                                                                                                                                                                                                                 | Technical regulations on medical treatment and medicine on board ships issued by the Danish Maritime Authority |                  |
| O.2                                                                                                                                                                                                                                 | Søfartsstyrelsens Lægebog                                                                                      |                  |
| O.2                                                                                                                                                                                                                                 | The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority                                            |                  |
| O.3                                                                                                                                                                                                                                 | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B                                             |                  |
| O.3                                                                                                                                                                                                                                 | Inventory, Controldocument and Userinstruction Category B MFAG B                                               |                  |
| O.5                                                                                                                                                                                                                                 | Radio Medical Optegnelser                                                                                      |                  |
| O.5                                                                                                                                                                                                                                 | Radio Medical Records                                                                                          |                  |
| O.6                                                                                                                                                                                                                                 | MFAG (Medical First Aid Guide)                                                                                 |                  |
| O.6                                                                                                                                                                                                                                 | MFAG (Medical First Aid Guide)                                                                                 |                  |
| O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. <a href="http://www.soefartsstyrelsen.dk">www.soefartsstyrelsen.dk</a><br>O.3 must be available in digital or printed version. <a href="http://www.dma.dk">www.dma.dk</a> |                                                                                                                |                  |

## **Januar 2021 - Version 2.6**

Tilføjet "Id of ship" (side 3)

16.3 Hydroxyethylstivelse udgår

Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3

Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning

Tilføjet C.13 Engangsforklæde

Tilføjet C.14 Lagen, sterilt

Tilføjet F.7 Hypotermi Termometer

Added "Id of ship" (page 3)

16.3 Hydroxyethyl amoid is discontinued product

Added 16.6 Gelatine Sodium Chlorid replace 16.3

Added B.14 Torniquet to artieriel bleeding

Added C.13 Dispasable apron

Added C.14 Bed sheet, sterile

Added F.7 Hypotermi thermometer

## **August 2021 - Version 2.5**

6.3 Diazepam klysma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden

7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet

COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket

6.3 Diazepam enema streingth corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience

7.10 Vaccine Tetanus - label corrected

COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked.

## **January 2021 - Version 2.4**

Tilføjet side med ekstramedicin og medicinsk udstyr i forbindelse med

Covid-19. Side 82-88

Det er frivilligt om skibet vil medbringe medicinen og udstyr eller dele deraf.

Added page with additional medicine and medical equipment in connection with

Covid-19. Page 82-88

It is optional if the ship will bringe the medicine and equipment or part of it

# Ekstra medicin og udstyr pga covid-19 / Extra medicine and equipment due to Covid-19

| Tillægsmedicin pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående /<br>Extra medicine due to Covid- 19. It is not mandtory to bring this medicine on bord |          |                                                        |                         |                                                                                                                       |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Grp. No.                                                                                                                                                          | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutecal<br>Ingredient | Adm. Form/<br>Form      | Styrke / Strength                                                                                                     | Mængde/<br>Quentety B | MFAG B |
| 4.6                                                                                                                                                               | H02AB06  | Prednisolon                                            | tbl.                    | 25 mg                                                                                                                 | 30 stk.               | 0      |
| 4.6                                                                                                                                                               | H02AB06  | Prednisolon                                            | tablets.                | 25 mg                                                                                                                 | 30 pcs.               | 0      |
| 5.2                                                                                                                                                               | H04AA01  | Glucagon "K"                                           | inj. Tørstof +<br>Væske | 1 mg                                                                                                                  | 2 stk.                | 0      |
| 5.2                                                                                                                                                               | H04AA01  | Glucagon "R"                                           | inj. Subst +<br>solvens | 1 mg                                                                                                                  | 2 pc.                 | 0      |
| 7.14                                                                                                                                                              | J01CR02  | Amoxicillin/clavulansyre                               | tbl.                    | 500/125 mg                                                                                                            | 20 stk.               | 0      |
| 7.14                                                                                                                                                              | J01CR02  | Amoxicillin/clavulanacid                               | tablets.                | 500/125 mg                                                                                                            | 20 pcs.               | 0      |
| 7.15                                                                                                                                                              | J01FA10  | Azithromycin                                           | tbl.                    | 500 mg                                                                                                                | 5 x 3stk.             | 0      |
| 7.15                                                                                                                                                              | J01FA10  | Azithromycin                                           | tablets.                | 500 mg                                                                                                                | 5 x 3 pcs.            | 0      |
| 9.7                                                                                                                                                               | B01AB10  | Tinzaparin                                             | inj                     | 4.500IE                                                                                                               | 1 boks af 10 stk.     | 0      |
| 9.7                                                                                                                                                               | B01AB10  | Tinzaparine                                            | inj.                    | 4.500IE                                                                                                               | 1 box of 10 pcs.      | 0      |
| 12.13                                                                                                                                                             | A04AA01  | Ondasetron                                             | tbl.                    | 4 mg                                                                                                                  | 10 stk.               | 0      |
| 12.13                                                                                                                                                             | A04AA01  | Ondasetron                                             | tablets.                | 4 mg                                                                                                                  | 10 pcs.               | 0      |
| 12.14                                                                                                                                                             | A06AD65  | Movicol                                                | oral<br>opløsning       | 46,6 mg kaliumchlorid,<br>13,125 g macrogol 3350,<br>350,7 mg natriumchlorid,<br>178,5 mg<br>natriumhydrogencarbonat. | 4 bokse af 8 stk.     | 0      |
| 12.14                                                                                                                                                             | A06AD65  | Movicol                                                | oral solution           | 46,6 mg kaliumchlorid,<br>13,125 g macrogol 3350,<br>350,7 mg natriumchlorid,<br>178,5 mg<br>natriumhydrogencarbonat. | 4 boxes of 8 pcs.     | 0      |
| 13.12                                                                                                                                                             | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortison                          | øredråber               | 10+2mg/ml                                                                                                             | 3 x 10 ml             | 0      |
| 13.12                                                                                                                                                             | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortisone                         | eardrops                | 10+2mg/ml                                                                                                             | 3 x 10 ml             | 0      |

| Grp. No.                                                                                                                                                                                         | Medicinsk udstyr / Medical equipment                     | Mængde/ Quentety B | MFAG B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Tillægsudstyr pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående /<br>Extra equipment due to Covid- 19. It is not mandtory to bring this medicine on bord                                |                                                          |                    |        |
| A.19                                                                                                                                                                                             | Iltbrille                                                | 2 stk.             | 0      |
| A.19                                                                                                                                                                                             | Nasal Cannula                                            | 2 pcs.             | 0      |
| A.20                                                                                                                                                                                             | Venturi iltmaske med sæt af justerbare diluter           | 2 sæt              | 0      |
| A.20                                                                                                                                                                                             | Venturi oxygen mask with set of adjustable dilutes       | 2 sets             | 0      |
| G.8                                                                                                                                                                                              | Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)                      | 5 stk.             | 0      |
| G.8                                                                                                                                                                                              | Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)                | 5 pcs.             | 0      |
| G.9                                                                                                                                                                                              | Hurtig test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab) * Se note | 10 stk.            | 0      |
| G.9                                                                                                                                                                                              | Rapid test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab)* See note  | 10 pcs.            | 0      |
| Følge producentens vejledning. Se digital vejledning/e-learning på producentens hjemmeside.<br>Follow the manufacturer's guideline. See digital guideline / E-learning on manufacturer's website |                                                          |                    |        |

# Brugervejledninger / User instruction

| Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness |            |                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Allergiske reaktioner, hævelser osv.Oral behandling<br>Covid-19                         | 4.6        | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Prednisolon                                           |
|                                                                                         |            | <b>Form:</b>                              | Tabletter á 25 mg                                     |
|                                                                                         |            | <b>Virkning:</b>                          | Bremser allergiske reaktioner, hævelser.              |
|                                                                                         |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination af Radio Medical Danmark             |
|                                                                                         | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Forhøjet tryk i øjet, slører infektion. Infektion     |
|                                                                                         | H02AB06    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktion dato (Prednisolon, Actavis)       |
|                                                                                         |            | <b>Opbevaring:</b>                        | normal temperatur                                     |
|                                                                                         |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical.                         |
| Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred.<br>Partly COVID spin off.  | 4.6        | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Prednisolon                                           |
|                                                                                         |            | <b>Form:</b>                              | Tablets of 25 mg                                      |
|                                                                                         |            | <b>Effect:</b>                            | Brakes allergic reation, swelling etc.                |
|                                                                                         |            | <b>Dosage:</b>                            | After precipstion from Radio Medical                  |
|                                                                                         | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Glaucoma, blurs infections, infekctions               |
|                                                                                         | H02AB06    | <b>Validity:</b>                          | 2 years from productions date ( Prednisolon, Actavis) |
|                                                                                         |            | <b>Storage:</b>                           | normal temperature                                    |
|                                                                                         |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Denmark                         |

4.6 Tablet / Tablets  
 Prednisolon 25 mg  
 Indikation / IndicationAllergi / Allergy  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

## Grp. 5. Antidoter / Antidotes

|                                                        |         |                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insulintilfælde Insulinshock<br>Lavt blodsukker        | 5.2     | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Glucagon.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        |         | <b>Form:</b>                              | Ready-set bestående af:<br>Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.                                                                             |
|                                                        |         | <b>Virkning:</b>                          | Frigør sukkerreserver fra leveren.<br>Virker normalt inden 5- 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.                                                                                               |
|                                                        |         | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 -15 minutter.<br>Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.                                                                       |
|                                                        | ATC     | <b>Bivirkninger:</b>                      | Kvalme og opkastninger kan forekomme.<br>Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).                                                                      |
|                                                        | H04AA01 | <b>Holdbarhed:</b>                        | Holdbarhed: Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).<br>Ved 2 - 8°C: 36 måneder fra produktionsdato.<br>Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart. |
|                                                        |         | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur eller 2 - 8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).                                                                                                                                       |
|                                                        |         | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical.<br>Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.                                                                                    |
| Hypoglycaemic coma<br>Insulin shock<br>Low blood sugar | 5.2     | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Glucagon.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        |         | <b>Form:</b>                              | Ready-set consisting of:<br>Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.                                                               |
|                                                        |         | <b>Effect:</b>                            | Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.                                                                                              |
|                                                        |         | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes.<br>When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.                                                         |
|                                                        | ATC     | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea and vomiting may occur.<br>May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).                                                   |
|                                                        | H04AA01 | <b>Validity:</b>                          | At room temperature: 18 months from the date of production (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).<br>At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.             |
|                                                        |         | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature or 2-8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).                                                                                                                                               |
|                                                        |         | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical.<br>If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.                                                                                                       |

5.2 inj.substans. / inj.substance  
Glucagon 1mg  
Indikation / Indication: Lav blodsukker / Low blood sugar  
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

| Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MFAG table 9<br>Kemisk<br>Lungebetændelse                                                                                                                                                                                                                                          | 7.14       | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Amoxicillin/clavulansyre                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                              | Tablets 500+125 mg                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Virkning:</b>                          | Prevent inflammation. Kills bacteria                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosering:</b>                          | 500 mg x 3 times daily                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning.<br>Kløe, hududslæt, svamp i munden                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01CJ02    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS )                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical<br>Allergisk shock er meget sjældent og forekommer normalt inden for 30 minutter efter administration.<br>Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulær. (4.1) |
| MFAG table 9<br>Pneumonia after<br>inhalation of poisonous<br>chemical substances                                                                                                                                                                                                  | 7.14       | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Amoxicillin/clavulanacid                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                              | Tablets 500+125 mg                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Effect:</b>                            | Prevent inflammation. Kills bacteria                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosage:</b>                            | 500 mg x 3 times daily                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Diarrhea, Abdominal pain, Nausea, Vomiting.<br>Itching, Skin rash, Fungus in the mouth                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01CJ02    | <b>Validity:</b>                          | 3 years from the date of production (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS )                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical.<br>Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration.<br>Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)                      |
| Halsbetændelse<br>Mundhuleinfektioner<br>Bihulebetændelse<br>Mellemørebetændelse<br>Lungebetændelse<br>Legionella<br>Chlamydia infektioner<br>Mavesårsinfektioner<br><br>Alternativ til penicillin ved<br>allergi<br><br>MFAG tabel 9                                              | 7.15       | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Azithromycin                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                              | Tabletter 500mg                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Virkning:</b>                          | Standser bakteriernes vækst                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosering:</b>                          | Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kraftsløshed, svimmelhed,<br>smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt.                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01FA10    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA).                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Almindelig temperatur                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical                                                                                                                                                             |
| Inflammation of the<br>throat Infections of the<br>oral cavity<br>Sinusitis Inflammation of<br>the middle ear<br>Pneumonia Legionella<br>Chlamydia infections<br>Infections in connection<br>with ulcer<br><br>Alternative to penicillin in<br>case of allergy<br><br>MFAG table 9 | 7.15       | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Azithromycin                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                              | Tablets of 500mg                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Effect:</b>                            | Stops bacterial growth                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 500 mg x 1-2 daily                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness, dizziness, taste<br>disturbances, headache, itchy skin and skin rash.                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01FA10    | <b>Validity:</b>                          | 5 years from date of production (Azithromycin, KRKA)                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical                                                                                                                                                                    |

7.14 Tablet / Tablets  
 Amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg  
 Indikation / Indication: Infektioner / Infections  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

7.15 Tablet / Tablets  
 Azithromycin 500 mg  
 Indikation / Indication: Infektioner / Infections  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

| Grp. 9 Hjerte / Cardiac |            |                                           |                                                                        |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Blodfortynding          | 9.7        | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Tinzaparin                                                             |
|                         |            | <b>Form:</b>                              | Injektion 4500IE                                                       |
|                         |            | <b>Virkning:</b>                          | Blodfortynding                                                         |
|                         |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination af Radio Medical Danmark                              |
|                         | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Blødningstendens, blodmangel, irritation ved indstiksstedet, Hæmatomer |
|                         | B01AB10    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Innohep, Paranova, Danmark)                 |
|                         |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25 °C                                                        |
|                         |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical Danmark                                   |
| Blood diluting          | 9.7        | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Tinzaparine                                                            |
|                         |            | <b>Form:</b>                              | Injection 4500IE                                                       |
|                         |            | <b>Effect:</b>                            | Blood diluting                                                         |
|                         |            | <b>Dosage:</b>                            | After prescription from Radio Medical Danmark                          |
|                         | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Bleeding tendency, anemia, injection site irritation, Hematomas.       |
|                         | B01AB10    | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date (Innohep, Paranova, Danmark)              |
|                         |            | <b>Storage:</b>                           | Not above 25 °C                                                        |
|                         |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Danmark                                          |

9.7 Inj. / inj.  
**Tinzaparine 4500IE**  
 Indikation / Indication: Blodfortynding / Blood diluting  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

## Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal

|                                                              |            |                                           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalme<br>Opkastninger<br>MFAG tabel 7, 8, 10, 13,<br>15, 20 | 12.13      | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ondansetron                                                                         |
|                                                              |            | <b>Form:</b>                              | Tabeletter 4 mg                                                                     |
|                                                              |            | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker kvalme og opkast                                                          |
|                                                              |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination fra Radio Medical Danmark                                          |
|                                                              | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmekølelse                                      |
|                                                              | A04AA01    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktions dato (Aurobindo Pharma)                                        |
|                                                              |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur                                                                   |
|                                                              |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical Danmark                                                |
| Nausea<br>Vomiting<br>MFAG tabel 7, 8, 10, 13,<br>15, 20     | 12.13      | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Ondansetron                                                                         |
|                                                              |            | <b>Form:</b>                              | Tablets 4 mg                                                                        |
|                                                              |            | <b>Effect:</b>                            | Prevent Nausea and vomiting                                                         |
|                                                              |            | <b>Dosage:</b>                            | By prescription from Radio Medical Danmark                                          |
|                                                              | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Headache, Constipation, Redness and warm feeling                                    |
|                                                              | A04AA01    | <b>Validity:</b>                          | 5 years from production date (Aurobindo Pharma)                                     |
|                                                              |            | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                  |
|                                                              |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Danmark                                                       |
| Forstoppelse                                                 | 12.14      | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Movicol®                                                                            |
|                                                              |            | <b>Form:</b>                              | Pulver til oral opløsning                                                           |
|                                                              |            | <b>Virkning:</b>                          | Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres                                 |
|                                                              |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination fra Radio Medical Danmark                                          |
|                                                              | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.    |
|                                                              | A03FA03    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Movicol®, Norgine BV)                                    |
|                                                              |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25 °C                                                                     |
|                                                              |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | søg samråd med Radio Medical                                                        |
| Constipation                                                 | 12.14      | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Movicol®                                                                            |
|                                                              |            | <b>Form:</b>                              | Powder for oral solution                                                            |
|                                                              |            | <b>Effect:</b>                            | Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools                          |
|                                                              |            | <b>Dosage:</b>                            | By prescription from Radio Medical Danmark                                          |
|                                                              | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, Meteorism, Vomiting. |
|                                                              | A03FA03    | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date (Movicol®, Norgine BV)                                 |
|                                                              |            | <b>Storage:</b>                           | Not above 25 °C                                                                     |
|                                                              |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical                                                               |

12.13 Tablet / Tablets

**Ondansetron 4 mg**

Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20

Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / Storage normal temperatur.

12.14 Pulver / Power

**Movicol**

Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation  
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

### Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

|                |            |                                           |                                                                          |
|----------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Øregangs eksem | 13.12      | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ciprofloxacin / Hydrocortison                                            |
|                |            | <b>Form:</b>                              | Øredråber                                                                |
|                |            | <b>Virkning:</b>                          | Behandling af øregangs eksem                                             |
|                |            | <b>Dosering:</b>                          | 3 dråber i berørte øre 2 gange daglig                                    |
|                | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Ørekløe, øresmerter, svimmelhed                                          |
|                | S01FA06    | <b>Holdbarhed:</b>                        | Ubrudt 2 år fra produktionsdato ( Ciflox, Novartis Healthcare A/S)       |
|                |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Beskytte mod lys og ikke over 25 c. Må ikke opbevares i køleskab.        |
|                |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical Danmark                                     |
| Ear eczema     | 13.12      | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Ciprofloxacin / Hydrocortisone                                           |
|                |            | <b>Form:</b>                              | Eardrops                                                                 |
|                |            | <b>Effect:</b>                            | Treatment of ear canal eczema                                            |
|                |            | <b>Dosage:</b>                            | 3 drops in affected ear twice daily                                      |
|                | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Ear itching, earache, dizziness                                          |
|                | S01FA06    | <b>Validity:</b>                          | Unbroken 2 years from production date ( Ciflox, Novartis Healthcare A/S) |
|                |            | <b>Storage:</b>                           | Protect from light and not more than 25 c. Do not refrigerate.           |
|                |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Danmark                                            |

13.12 Øredråber / Eardrops

**Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg**

Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema

Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket  
 COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked.

## Ekstra medicin og udstyr pga covid-19 / Extra medicine and equipment due to Covid-19

| Tillægsmedicin pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående /<br>Extra medicine due to Covid- 19. It is not mandtory to bring this medicine on bord |          |                                                        |                         |                                                                                                                       |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Grp. No.                                                                                                                                                          | ATC-code | Lægemiddelstof/<br>Active Pharmaceutecal<br>Ingredient | Adm. Form/<br>Form      | Styrke / Strength                                                                                                     | Mængde/<br>Quentety B | MFAG B |
| 4.6                                                                                                                                                               | H02AB06  | Prednisolon                                            | tbl.                    | 25 mg                                                                                                                 | 30 stk.               | 0      |
| 4.6                                                                                                                                                               | H02AB06  | Prednisolon                                            | tablets.                | 25 mg                                                                                                                 | 30 pcs.               | 0      |
| 5.2                                                                                                                                                               | H04AA01  | Glucagon "K"                                           | inj. Tørstof +<br>Væske | 1 mg                                                                                                                  | 2 stk.                | 0      |
| 5.2                                                                                                                                                               | H04AA01  | Glucagon "R"                                           | inj. Subst +<br>solvens | 1 mg                                                                                                                  | 2 pc.                 | 0      |
| 7.14                                                                                                                                                              | J01CR02  | Amoxicillin/clavulansyre                               | tbl.                    | 500/125 mg                                                                                                            | 20 stk.               | 0      |
| 7.14                                                                                                                                                              | J01CR02  | Amoxicillin/clavulanacid                               | tablets.                | 500/125 mg                                                                                                            | 20 pcs.               | 0      |
| 7.15                                                                                                                                                              | J01FA10  | Azithromycin                                           | tbl.                    | 500 mg                                                                                                                | 5 x 3stk.             | 0      |
| 7.15                                                                                                                                                              | J01FA10  | Azithromycin                                           | tablets.                | 500 mg                                                                                                                | 5 x 3 pcs.            | 0      |
| 9.7                                                                                                                                                               | B01AB10  | Tinzaparin                                             | inj.                    | 4.500IE                                                                                                               | 1 boks af 10 stk.     | 0      |
| 9.7                                                                                                                                                               | B01AB10  | Tinzaparine                                            | inj.                    | 4.500IE                                                                                                               | 1 box of 10 pcs.      | 0      |
| 12.13                                                                                                                                                             | A04AA01  | Ondasetron                                             | tbl.                    | 4 mg                                                                                                                  | 10 stk.               | 0      |
| 12.13                                                                                                                                                             | A04AA01  | Ondasetron                                             | tablets.                | 4 mg                                                                                                                  | 10 pcs.               | 0      |
| 12.14                                                                                                                                                             | A06AD65  | Movicol                                                | oral<br>opløsning       | 46,6 mg kaliumchlorid,<br>13,125 g macrogol 3350,<br>350,7 mg natriumchlorid,<br>178,5 mg<br>natriumhydrogencarbonat. | 4 bokse af 8 stk.     | 0      |
| 12.14                                                                                                                                                             | A06AD65  | Movicol                                                | oral solution           | 46,6 mg kaliumchlorid,<br>13,125 g macrogol 3350,<br>350,7 mg natriumchlorid,<br>178,5 mg<br>natriumhydrogencarbonat. | 4 boxes of 8 pcs.     | 0      |
| 13.12                                                                                                                                                             | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortison                          | øretråber               | 10+2mg/ml                                                                                                             | 3 x 10 ml             | 0      |
| 13.12                                                                                                                                                             | S02CA03  | Ciprofloxacin / Hydrocortisone                         | eardrops                | 10+2mg/ml                                                                                                             | 3 x 10 ml             | 0      |

| Grp. No.                                                                                                                                                                                                                                    | Medicinsk udstyr / Medical equipment                     | Mængde/ Quentety B | MFAG B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Tillægsudstyr pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående /<br>Extra equipment due to Covid- 19. It is not mandtory to bring this medicine on bord                                                                           |                                                          |                    |        |
| A.19                                                                                                                                                                                                                                        | Iltbrille                                                | 2 stk.             | 0      |
| A.19                                                                                                                                                                                                                                        | Nasal Cannula                                            | 2 pcs.             | 0      |
| A.20                                                                                                                                                                                                                                        | Venturi iltmaske med sæt af justerbare diluter           | 2 sæt              | 0      |
| A.20                                                                                                                                                                                                                                        | Venturi oxygen mask with set of adjustable dilutes       | 2 sets             | 0      |
| G.8                                                                                                                                                                                                                                         | Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)                      | 5 stk.             | 0      |
| G.8                                                                                                                                                                                                                                         | Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)                | 5 pcs.             | 0      |
| G.9                                                                                                                                                                                                                                         | Hurtig test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab) * Se note | 10 stk.            | 0      |
| G.9                                                                                                                                                                                                                                         | Rapid test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab)* See note  | 10 pcs.            | 0      |
| Følge producentens vejledning. Se digital vejledning/e-learning på producentens hjemmeside. Skal være CE-mærket.<br>Follow the manufacturer's guideline. See digital guideline / E-learning on manufacturer's website. Have to be CE-marked |                                                          |                    |        |

## Brugervejledninger / User instruction

### Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness

|                                                                                     |            |                                           |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Allergiske reaktioner, hævelser osv. Oral behandling Covid-19                       | 4.6        | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Prednisolon                                           |
|                                                                                     |            | <b>Form:</b>                              | Tabletter á 25 mg                                     |
|                                                                                     |            | <b>Virkning:</b>                          | Bremser allergiske reaktioner, hævelser.              |
|                                                                                     |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination af Radio Medical Danmark             |
|                                                                                     | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Forhøjet tryk i øjet, slører infektion. Infektion     |
|                                                                                     | H02AB06    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 2 år fra produktion dato (Prednisolon, Actavis)       |
|                                                                                     |            | <b>Opbevaring:</b>                        | normal temperatur                                     |
|                                                                                     |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical.                         |
| Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred. Partly COVID spin off. | 4.6        | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Prednisolon                                           |
|                                                                                     |            | <b>Form:</b>                              | Tablets of 25 mg                                      |
|                                                                                     |            | <b>Effect:</b>                            | Brakes allergic reation, swelling etc.                |
|                                                                                     |            | <b>Dosage:</b>                            | After precipstion from Radio Medical                  |
|                                                                                     | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Glaucoma, blurs infections, infekctions               |
|                                                                                     | H02AB06    | <b>Validity:</b>                          | 2 years from productions date ( Prednisolon, Actavis) |
|                                                                                     |            | <b>Storage:</b>                           | normal temperature                                    |
|                                                                                     |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Denmark                         |

4.6 Tablet / Tablets  
 Prednisolon 25 mg  
 Indikation / Indication Allergi / Allergy  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

### Grp. 5. Antidoter / Antidotes

|                                                 |            |                        |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insulintilfælde Insulinshock<br>Lavt blodsukker | 5.2        | <b>Lægemiddelstof:</b> | Glucagon.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |            | <b>Form:</b>           | Ready-set bestående af:<br>Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.                                                                             |
|                                                 |            | <b>Virkning:</b>       | Frigør sukkerreserver fra leveren.<br>Virker normalt inden 5- 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.                                                                                               |
|                                                 |            | <b>Dosering:</b>       | Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 -15 minutter.<br>Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.                                                                       |
|                                                 | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>   | Kvalme og opkastninger kan forekomme.<br>Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).                                                                      |
|                                                 | H04AA01    | <b>Holdbarhed:</b>     | Holdbarhed: Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).<br>Ved 2 - 8°C: 36 måneder fra produktionsdato.<br>Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart. |
|                                                 |            | <b>Opbevaring:</b>     | Almindelig temperatur eller 2 - 8°C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).                                                                                                                                       |

|                                                        |            |                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical.<br>Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.                                                                        |
| Hypoglycaemic coma<br>Insulin shock<br>Low blood sugar | 5.2        | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Glucagon.                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |            | <b>Form:</b>                              | Ready-set consisting of:<br>Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.                                                   |
|                                                        |            | <b>Effect:</b>                            | Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.                                                                                  |
|                                                        |            | <b>Dosage:</b>                            | Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.                                                |
|                                                        | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Nausea and vomiting may occur.<br>May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).                                       |
|                                                        | H04AA01    | <b>Validity:</b>                          | At room temperature: 18 months from the date of production (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).<br>At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately. |
|                                                        |            | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature or 2-8°C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).                                                                                                                                   |
|                                                        |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical.<br>If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.                                                                                           |

5.2 inj.substans. / inj.substance  
Glucagon 1mg  
Indikation / Indication: Lav blodsukker / Low bloodsugar  
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

## Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections

|                                           |            |                        |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MFAG table 9<br>Kemisk<br>Lungebetændelse | 7.14       | <b>Lægemiddelstof:</b> | Amoxicillin/clavulansyre                                                                                                                                                                 |
|                                           |            | <b>Form:</b>           | Tablets 500+125 mg                                                                                                                                                                       |
|                                           |            | <b>Virkning:</b>       | Prevent inflammation. Kills bacteria                                                                                                                                                     |
|                                           |            | <b>Dosering:</b>       | 500 mg x 3 times daily                                                                                                                                                                   |
|                                           | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>   | Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning.<br>Kløe, hududslæt, svamp i munden                                                                                                              |
|                                           | J01CJ02    | <b>Holdbarhed:</b>     | 3 år fra produktions dato (Amoxicillin/clavulansyre, COfarma ApS )                                                                                                                       |
|                                           |            | <b>Opbevaring:</b>     | Normal temperatur                                                                                                                                                                        |
|                                           |            | <b>Anmærkninger:</b>   | Søg samråd med Radio Medical<br>Allergisk shock er meget sjældent og forekommer normalt inden for 30 minutter efter administration.<br>Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulær. (4.1) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MFAG table 9<br>Pneumonia after<br>inhalation of poisonous<br>chemical substances                                                                                                                                                                                                  | 7.14       | <b>Active<br/>Pharmaceutical<br/>ingredients:</b> | Amoxicillin/clavulanacid                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                                      | Tablets 500+125 mg                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Effect:</b>                                    | Prevent inflammation. Kills bacteria                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosage:</b>                                    | 500 mg x 3 times daily                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                              | Diarrhea, Abdominal pain, Nausea, Vomiting.<br>Itching, Skin rash, Fungus in the mouth                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01CJ02    | <b>Validity:</b>                                  | 3 years from the date of production (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS )                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Storage:</b>                                   | Normal temperature                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Remarks:</b>                                   | Consult Radio Medical.<br>Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration.<br>Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1) |
| Halsbetændelse<br>Mundhuleinfektioner<br>Bihulebetændelse<br>Mellemørebetændelse<br>Lungebetændelse<br>Legionella<br>Chlamydia infektioner<br>Mavesårsinfektioner<br><br>Alternativ til penicillin ved<br>allergi<br><br>MFAG tabel 9                                              | 7.15       | <b>Lægemiddelstof:</b>                            | Azithromycin                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                                      | Tabletter 500mg                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Virkning:</b>                                  | Standser bakteriernes vækst                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosering:</b>                                  | Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt.                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                              | Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kræftsløshed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01FA10    | <b>Holdbarhed:</b>                                | 5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA).                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Opbevaring:</b>                                | Almindelig temperatur                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Anmærkninger:</b>                              | Søg samråd med Radio Medical                                                                                                                                        |
| Inflammation of the<br>throat Infections of the<br>oral cavity<br>Sinusitis Inflammation of<br>the middle ear<br>Pneumonia Legionella<br>Chlamydia infections<br>Infections in connection<br>with ulcer<br><br>Alternative to penicillin in<br>case of allergy<br><br>MFAG table 9 | 7.15       | <b>Active<br/>Pharmaceutical<br/>ingredients:</b> | Azithromycin                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Form:</b>                                      | Tablets of 500mg                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Effect:</b>                                    | Stops bacterial growth                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Dosage:</b>                                    | Adults: 500 mg x 1-2 daily                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                              | Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness, dizziness, taste disturbances, headache, itchy skin and skin rash.                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J01FA10    | <b>Validity:</b>                                  | 5 years from date of production (Azithromycin, KRKA)                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Storage:</b>                                   | Normal temperature                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Remarks:</b>                                   | Consult Radio Medical                                                                                                                                               |

7.14 Tablet / Tablets  
Amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg  
Indikation / Indication: Infektioner / Infections  
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user  
instruction in the Inventory  
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio  
Medical  
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal  
temperature

7.15 Tablet / Tablets  
Azithromycin 500 mg  
Indikation / Indication: Infektioner / Infections  
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user  
instruction in the Inventory  
Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio  
Medical  
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal  
temperature

## Grp. 9 Hjerte / Cardiac

|                |     |                        |                  |
|----------------|-----|------------------------|------------------|
| Blodfortynding | 9.7 | <b>Lægemiddelstof:</b> | Tinzaparin       |
|                |     | <b>Form:</b>           | Injektion 4500IE |

|                |            |                                           |                                                                        |
|----------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                |            | <b>Virkning:</b>                          | Blodfortynding                                                         |
|                |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination af Radio Medical Danmark                              |
|                | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Blødningstendens, blodmangel, irritation ved indstiksstedet, Hæmatomer |
|                | B01AB10    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Innohep, Paranova, Danmark)                 |
|                |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25 °C                                                        |
|                |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical Danmark                                   |
| Blood diluting | 9.7        | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Tinzaparine                                                            |
|                |            | <b>Form:</b>                              | Injection 4500IE                                                       |
|                |            | <b>Effect:</b>                            | Blood diluting                                                         |
|                |            | <b>Dosage:</b>                            | After prescription from Radio Medical Danmark                          |
|                | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Bleeding tendency, anemia, injection site irritation, Hematomas.       |
|                | B01AB10    | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date (Innohep, Paranova, Danmark)              |
|                |            | <b>Storage:</b>                           | Not above 25 °C                                                        |
|                |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Danmark                                          |

9.7 Inj. / inj.

#### **Tinzaparine 4500IE**

Indikation / Indication: Blodfortynding / Blood diluting  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory  
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

| <b>Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal</b>            |            |                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kvalme<br>Opkastninger<br>MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20 | 12.13      | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Ondansetron                                   |
|                                                           |            | <b>Form:</b>                              | Tabletter 4 mg                                |
|                                                           |            | <b>Virkning:</b>                          | Modvirker kvalme og opkast                    |
|                                                           |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination fra Radio Medical Danmark    |
|                                                           | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmfølelse |
|                                                           | A04AA01    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 5 år fra produktions dato ( Aurobindo Pharma) |
|                                                           |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Normal temperatur                             |
|                                                           |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | Søg samråd med Radio Medical Danmark          |
| Nausea<br>Vomiting                                        | 12.13      | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Ondansetron                                   |

|                                 |            |                                           |                                                                                     |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20 |            | <b>Form:</b>                              | Tablets 4 mg                                                                        |
|                                 |            | <b>Effect:</b>                            | Prevent Nausea and vomiting                                                         |
|                                 |            | <b>Dosage:</b>                            | By prescription from Radio Medical Denmark                                          |
|                                 | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Headache, Constipation, Redness and warm feeling                                    |
|                                 | A04AA01    | <b>Validity:</b>                          | 5 years from production date ( Aurobindo Pharma)                                    |
|                                 |            | <b>Storage:</b>                           | Normal temperature                                                                  |
|                                 |            | <i>Remarks:</i>                           | Consult Radio Medical Danmark                                                       |
| Forstoppelse                    | 12.14      | <b>Lægemiddelstof:</b>                    | Movicol®                                                                            |
|                                 |            | <b>Form:</b>                              | Pulver til oral opløsning                                                           |
|                                 |            | <b>Virkning:</b>                          | Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres                                 |
|                                 |            | <b>Dosering:</b>                          | Efter ordination fra Radio Medical Danmark                                          |
|                                 | <b>ATC</b> | <b>Bivirkninger:</b>                      | Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.    |
|                                 | A03FA03    | <b>Holdbarhed:</b>                        | 3 år fra produktions dato (Movicol®, Norgine BV)                                    |
|                                 |            | <b>Opbevaring:</b>                        | Ikke over 25 °C                                                                     |
|                                 |            | <b>Anmærkninger:</b>                      | søg samråd med Radio Medical                                                        |
| Constipation                    | 12.14      | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Movicol®                                                                            |
|                                 |            | <b>Form:</b>                              | Powder for oral solution                                                            |
|                                 |            | <b>Effect:</b>                            | Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools                          |
|                                 |            | <b>Dosage:</b>                            | By prescripstion from Radio Medical Denmark                                         |
|                                 | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, Meteorism, Vomiting. |
|                                 | A03FA03    | <b>Validity:</b>                          | 3 years from production date (Movicol® ,Norgine BV)                                 |
|                                 |            | <b>Storage:</b>                           | Not above 25 °C                                                                     |
|                                 |            | <i>Remarks:</i>                           | Consult Radio Medical                                                               |

12.13 Tablet / Tablets  
**Ondasetron 4 mg**  
 Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.  
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
 Opbevaring / Storage normal temperatur.

12.14 Pulver / Power  
**Movicol**  
 Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation  
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.  
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical  
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

### Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

|                |         |                        |                                                                                       |
|----------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Øregangs eksem | 13.12   | <b>Lægemiddelstof:</b> | Ciprofloxacin / Hydrocortison                                                         |
|                |         | <b>Form:</b>           | Øredråber                                                                             |
|                |         | <b>Virkning:</b>       | Behandling af øregangs eksem                                                          |
|                |         | <b>Dosering:</b>       | 3 dråber i berørte øre 2 gange daglig                                                 |
|                | S01FA06 | <b>ATC</b>             | <b>Bivirkninger:</b> Ørekløe, øresmerter, svimmelhed                                  |
|                |         |                        | <b>Holdbarhed:</b> Ubrudt 2 år fra produktionsdato ( Ciflox, Novartis Healthcare A/S) |
|                |         |                        | <b>Opbevaring:</b> Beskytte mod lys og ikke over 25 c. Må ikke opbevares i køleskab.  |
|                |         |                        | <b>Anmærkninger:</b> Søg samråd med Radio Medical Denmark                             |

|            |            |                                           |                                                                          |
|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ear eczema | 13.12      | <b>Active Pharmaceutical ingredients:</b> | Ciprofloxacin / Hydrocortisone                                           |
|            |            | <b>Form:</b>                              | Eardrops                                                                 |
|            |            | <b>Effect:</b>                            | Treatment of ear canal eczema                                            |
|            |            | <b>Dosage:</b>                            | 3 drops in affected ear twice daily                                      |
|            | <b>ATC</b> | <b>Side-effects:</b>                      | Ear itching, earache, dizziness                                          |
|            | S01FA06    | <b>Validity:</b>                          | Unbroken 2 years from production date ( Ciflox, Novartis Healthcare A/S) |
|            |            | <b>Storage:</b>                           | Protect from light and not more than 25 c. Do not refrigerate.           |
|            |            | <b>Remarks:</b>                           | Consult Radio Medical Danmark                                            |

13.12 Øredråber / Eardrops

**Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg**

Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema

Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical