

6.3 Klysma Diazepam styrke ændret til 5 mg/ml
 6.3 Enema Diazepam strength changed to 5 mg/ml

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion			
Universelle kramper Kramper fra forgiftninger Abstinenskramper Epilepsi Akut sindsyge	6.3	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ
		Form:	Klysma, 4 mg/ml, 2,5 ml per klysma til anvendelse i endetarmen.
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	1Efter aftale med Radio Medical - 1 klysma tømmes ind i endetarmen.
		Bivirkninger:	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	2 $\frac{1}{2}$ år fra produktionsdato (Stesolid [®] , Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..
		Opbevaring:	Almindelig temperatur..
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy Acute mental illness	6.3	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam. Δ
		Form:	Enema, 4 mg /ml, 2, 5 ml per enema for insertion into the rectum.
		Effect:	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (halving time: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	After consult of Radio Medical - 1 enema is emptied into the rectum.
		Side-effects:	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	2 $\frac{1}{2}$ years from the date of production (Stesolid [®] , Actavis A/ S).
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredients	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity P
Grp. 1 Ilt / Oxygen					
1.2	-	Transportabelt udstyr, klargjort	Gas	-	2 l / 200 bar
1.2	-	Portable oxygen	Gas	-	2 l / 200 bar
1.3	-	Ekstra iltflaske	Gas	-	2 l / 200 bar
1.3	-	Spare Oxygen cylinder	Gas	-	2 l / 200 bar
Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics					
3.4	N02AA01	Morfin Δ	Inj.væske	10mg/ml	3*1ml
3.4	N02AA01	Morphine Δ	Inj. liquid	10mg/ml	3*1ml
Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness					
4.1	C01CA24	Adrenalin "K"	inj. Væske	1 mg / ml	2 x 1ml
4.1	C01CA24	Epinephrine "R"	inj. Liquid	1 mg / ml	2 x 1ml
Grp. 6 Akut sindsyge og kramper / Mental disorder and convulsion					
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	4 mg / ml	5 x 2½ ml
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	4 mg / ml	5 x 2½ ml
Grp. 7 Infektioner / Infections					
7.9	J01CA04	Ceftriaxon	Inj.tørstof+væske	1g	2 x 1g
7.9	J01CA04	Ceftriaxone	Inj.subst+solvans	1g	2 x 1g
Grp. 9 Hjerte / Cardiac					
9.1	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund spray	0,4 mg/dose	1x200 doser
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	0,4 mg/doses	1x200 doses
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	150 mg	20 stk.
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablet	150 mg	20 pcs.
9.5	C03CA01	Furosemid	Inj. væske	10 mg/ml	5x4 ml
9.5	C03CA01	Furosemide	Inj. Liquid	10 mg/ml	5x4 ml
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold					
15.2	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	200 doser
15.2	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/doses	200 doses
15.3	R03AC03	Terbutalin	Inj. Væske	0,5 mg/ml	2 x 1 ml
15.3	R03AC03	Terbutaline	Inj. Liquid	0,5 mg/ml	2 x 1 ml
15.4	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doser
15.4	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doses
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar					
16.1	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	1 x 1 liter
16.1	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	1 x 1 litre
16.4	V07AB	Glukose	Inf. Væske	100 mg/ml	500 ml
16.4	V07AB	Glucose	Inj. Liquid	100 mg/ml	500 ml
Infusionsvæsker skal være i plastcontainer/Infusion liquids shall be in plastic container					

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity P
A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment		
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr i henhold til vejledningen (se note)	1 stk
A.1	Mobile resuscitation equipment according to instructions (See note)	1 pc.
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	1 stk.
A.5	Guidel airway, size 3	1 pc.
A.8	Kraftig klædesaks	1 stk.
A.8	Strong scissors for clothes	1 pc.
A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1		
B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape		
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	1 ruller
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	1 rolls
C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation		
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	10 stk.
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	10 pcs.
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	10 stk.
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	10 pcs.
D. Sårbehandling / Treatment of wounds		
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	1 stk.
D.7	Surgical scissors w/straight points	1 pc.
E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion		
E.1	Kanylebøtte	1 stk.
E.1	Box for contaminated needles	1 pc.
E.2	Afspritningsswaps, isopropylalkohol 70%	10 stk.
E.2	Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70 %	10 pcs.
E.3	Staserem	1 stk.
E.3	Torniquet	1 pcs.
E.4	Optiva*2, intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g	5 stk.
E.4	Optiva*2, intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g	5 pcs.
E.5	Vecafix®, fikseringsplaster til intravenøs kanyle	5 stk.
E.5	Vecafix®, fixing plaster for intraveneos needle	5 pcs.
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	10 stk.
E.6	Needle, sterile, disposable single use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	10 pcs.
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	10 stk.
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	10 pcs.
E.9	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 10 ml	5 stk.
E.9	Syringes, sterile, single use, Luer, 10 ml	5 pcs.
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	2 stk.
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	2 pcs.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity P
F. Udstyr til medicinskundersøgelse / Equipment for medical examination		
F.1	Blodtryksmåler	1 stk.
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pc.
F.2	Stetoskop	1 stk.
F.2	Stethoscope	1 pc.
F.3	Digitalt lægetermometer	1stk.
F.3	Digital clinical thermometer	1 pcs.
F.4	Pencillygte m. batterier	1 stk.
F.4	Pencil lamp w/batteries	1 pcs.
K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation		
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	1 stk.
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	1 pc.
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	1 stk.
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	1 pc.
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	2 stk.
K.4	Stiff neck collar, adjustable	2 pcs.
OBS K.2-K.4 pakkes og opbevares sammen. / OBS K.2-K.4 should be packed and stored together		
O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.		
O.3	Fortegnelse, kontrol dokument og brugervejledning kategori P	1 stk
O.3	Inventory, Control document and User instruction Category P	1 pc.
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. O.3 must be available in digital or printed version.		

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml er erstattet med 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml is changed to 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredients	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity P
Grp. 1 Ilt / Oxygen					
1.2	-	Transportabelt udstyr, klargjort	Gas	-	2 l / 200 bar
1.2	-	Portable oxygen	Gas	-	2 l / 200 bar
1.3	-	Ekstra iltflaske	Gas	-	2 l / 200 bar
1.3	-	Spare Oxygen cylinder	Gas	-	2 l / 200 bar
Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics					
3.4	N02AA01	Morfin Δ	Inj.væske	10mg/ml	3*1ml
3.4	N02AA01	Morphine Δ	Inj. liquid	10mg/ml	3*1ml
Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness					
4.1	C01CA24	Adrenalin "K"	inj. Væske	1 mg / ml	2 x 1ml
4.1	C01CA24	Epinephrine "R"	inj. Liquid	1 mg / ml	2 x 1ml
Grp. 6 Akut sindsyge og kramper / Mental disorder and convulsion					
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	4 mg / ml	5 x 2½ ml
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	4 mg / ml	5 x 2½ ml
Grp. 7 Infektioner / Infections					
7.9	J01CA04	Ceftriaxon	Inj.tørstof+ væske	1g	2 x 1g
7.9	J01CA04	Ceftriaxone	Inj.subst+ solvens	1g	2 x 1g
Grp. 9 Hjerte / Cardiac					
9.1	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund spray	0,4 mg/dose	1x200 doser
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	0,4 mg/doses	1x200 doses
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	150 mg	20 stk.
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablet	150 mg	20 pcs.
9.5	C03CA01	Furosemid	Inj. væske	10 mg/ml	5x4 ml
9.5	C03CA01	Furosemide	Inj. Liquid	10 mg/ml	5x4 ml
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold					
15.2	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	200 doser
15.2	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/doses	200 doses
15.4	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doser
15.4	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doses
15.6	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Væske	0,5 mg/ml	2 x 1 ml
15.6	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Liquid	0,5 mg/ml	2 x 1 ml
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar					
16.1	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	1 x 1 liter
16.1	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	1 x 1 litre
16.4	V07AB	Glukose	Inf. Væske	100 mg/ml	500 ml
16.4	V07AB	Glucose	Inj. Liquid	100 mg/ml	500 ml
Infusionsvæskerne skal være i plastcontainer/Infusion liquids shall be in plastic container					

Label til 16.4 ændret med korrekt nummer.

<p>1.1 Gas / Gas Medicinsk Ilt / Medical Oxygen Indikation / Indication: Bevidstløse uden vejrtrækning, Bevidstløse med vejrtrækning, Medtaget almen tilstand. Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejrtrækningsbesvær / Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing. Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer. Hold flasketemperaturen under 50°C / Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50°C</p>	<p>9.5 inj.væske / inj.liquid Furosemid 10 mg/ ml Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic MFAG tables 2, 9 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.4 inj.væske / inj.liquid Δ Morfin 10 mg/ ml Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain; MFAG tables 7,8, 10,13 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>15.2 turbuhaler / turbuhaler Terbutalin 0,5 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma MFAG table 9 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>4.1 inj.væske / inj.liquid Adrenalin 1 mg/ml Indikation / Indication: Allergisk Shock / Allergic shock Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2– 8°C</p>	<p>15.4 turbuhaler / turbuhaler Budesonid 0,2 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma; MFAG table 9 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.3 klysma / enema Δ Diazepam 4 mg/ml Indikation / Indication: Kræmper / Convulsions; MFAG tables 4, 5, 6 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>15.5 næsespray / dråber / nose spray / drops Xylometazolin 1 mg/ml Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.9 inj.substans. / inj.substance Ceftriaxon 1 g Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 10 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>15.6 Inj / Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml Indikation / Indication: Astma / Asthma MFAG table 9 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.1 spray / aerosol Glycerylnitrat 0,4 mg/dose Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2 - 25°C</p>	<p>16.1 inf.væske / inf.liquid Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood; MFAG table 7 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.3 tablet / tablet Acetylsalicylsyre / acetylsalicylic acid 150 mg Indikation / Indication: Blodfortyndende / Blood thinning Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>	<p>16.4 Inj. væske / inj.liquid Glukose / glucose 100 mg/ml Indikation / Indication: Insulinshock / Insulin shock Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

October 2021 – Version 2..2.1

6.3 Klysma Diazepam styrke ændret til 5 mg/ml

6.3 Enema Diazepam strength changed to 5 mg/ml

Marx 2020 – Version 2.2

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml er erstattet med 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml is changed to 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

Label 16.4 ændret med korrekt nummer.

Label 16.4 changed with correct number